



60
років



РІПАК ОЗИМИЙ ТА ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ

2025



НАПРЯМКИ СЕЛЕКЦІЇ РІПАКУ

Артем Юр'єв

**продукт-менеджер з розвитку
зернових культур та озимих ріпаків**



За останні роки посівні площі під ріпаком зростають і ця культура знайшла своє місце у сівозмінах господарств усіх регіонів України. Чим це пояснюється? В першу чергу – високим попитом та ціною на продукцію його переробки, що робить його однією з найрентабельніших культур для українського виробника. З іншої сторони, це відмінна культура з точки зору оптимізації виробничих процесів у сільському господарстві. Так, з його допомогою ми розбавляємо сівозміну, особливо це актуально в умовах південної частини України; отримуємо раннє надходження коштів; розвантажуюмо та розподіляємо сезонні польові роботи, які не пересікаються з роботами на інших культурах.

Інші причини зростання посівних площ і урожайності відбувається за рахунок відточення технології вирощування цієї культури, а також надходження на ринок України більш продуктивних та адаптованих гібридів для наших умов господарювання.

Що компанія Лімагрейн може запропонувати аграріям України?

Завдяки одній з наших селекційних програм, яка спрямована на виведення гібридів для континентальних умов нам є що запропонувати ринку України. Наші селекціонери спрямовують свої зусилля на здатність гібридів використовувати наявні ресурси і протидіяти впливу негативних

факторів. Такі показники, як: морозостійкість, посухостійкість, толерантність до хвороб, стійкість до розтріскування стручків, швидкий розвиток кореневої системи – є стратегічними орієнтирами при створенні нових продуктів.

Генетична стійкість до розтріскування стручків.

Як нам відомо, після досягання стручки ріпаку мають дуже високу чутливість до розтріскування і через це обмежений період для збору врожаю, як правило він складає 3-5 днів, після чого стручки починають тріскатись і осипатись. Особливо критично це питання постає в умовах сильних вітрів, дощів з градом, а також при затягуванні періоду збирання через відсутність техніки у потрібний момент. В даних обставинах ми ризикуємо втратити суттєву частину нашого врожаю і відповідно прибутку.

Саме для таких умов, селекціонери компанії Лімагрейн перейшли на платформу створення гібридів ріпаку, яка передбачає наявність генетично-покращеної стійкості до розтріскування стручків.

В умовах, коли ми вкладаємо великі кошти у технологію виробництва даної культури, зокрема у ЗЗР, живлення та інш., покращена стійкість до розтріскування стручків є фінальним доповненням Вашої технології, яка виступає в якості страхівки у критичний період перед збиранням врожаю.



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТРІСКУВАННЯ СТРУЧКІВ

Дуже часто, як правило протягом збиральної компанії аграрії помічають, що стручки на певних гібридах ріпаку починають тріскатись та осипатись, через що господарства починають втрачати врожай і, відповідно, прибуток на який розраховували. Це регулярне явище, і ні для кого вже не секрет, що гібриди ріпаку відрізняються за стійкістю до розтріскування стручків. Це все пояснюється різними селекційними підходами при виведенні гібридів. Якщо точніше, існують 2 принципово різні платформи, одна з них – OGURA, в межах якої можливо отримати гібриди з генетичною стійкістю до розтріскування стручків і, відповід-

но, високий та стабільний рівень врожайності. В європейських країнах, тенденція з надання переваги саме гібридам, які мають таку особливість відбувається вже давно, і, наприклад у Франції, Німеччині, Великій Британії вже близько 70-75% посівних площ засіяні саме гібридами стійкими до розтріскування стручків, адже аграрії переймаються за кожен чинник, який може знизити їхній врожай. Натомість в Україні, тільки 30-35% площ засівається такими гібридами, що, своєю чергою створює зайві ризики для виробництва даної культури.

НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ГІБРИДІВ БЕЗ СТІЙКОСТІ ДО РОЗТРІСКУВАННЯ


- При затримці зі збиранням і перестоем на полі – рівень втрат може бути в межах 5%
- При дощовій погоді у період достигання та при коливанні температури схильність до розтріскування таких гібридів підвищується і рівень втрат може сягати – 10-15%.
- При дощовій погоді з градом – рівень втрат може сягати 50%
- Плюс до цього, ми отримуємо падалицю, з якою необхідно буде боротись у наступних культурах.

В умовах України стійкість до розтріскування має вирішальне значення, адже, як правило, площі під посівом даної культури дуже великі, а кількість збиральної техніки часто обмежена, що сприяє збільшенню періоду збирання, і, відповідно ризиків, які можуть негативно вплинути на кінцевий рівень врожайності.


**ВСІ ГІБРИДИ КОМПАНІЇ ЛІМАГРЕЙН
ВИВЕДЕНІ НА ПЛАТФОРМІ OGURA
ІЗ ГЕНЕТИЧНОЮ СТІЙКІСТЮ ДО
РОЗТРІСКУВАННЯ СТРУЧКІВ.**

В умовах, коли ми вкладаємо великі кошти у виробництво даної культури, зокрема у ЗЗР, живлення, догляд та інш., стійкість до розтріскування стручків є фінальним доповненням технології, що виступає в якості страховки у критичний період перед збиранням врожаю.


Стійкість до розтріскування – перевага гібридів селекції Лімагрейн



Звичайні гібриди без стійкості до розтріскування



Гібриди Лімагрейн зі стійкістю до розтріскування



ГІБРИД КОНКУРЕНТ БЕЗ СТІЙКОСТІ ДО РОЗТРИСКУВАННЯ ПІСЛЯ ДОЩУ З ГРАДОМ. РІЗНИЦЯ У ВРОЖАЙНОСТІ 1.4Т/ГА.



ГІБРИД АБСОЛЮТ. 95% СТРУЧКІВ ЦІЛІ.

05.07.2024, Київська обл, Переяслав-Хмельницький р-н.
Різниця у врожайності між гібридом Абсолют та конкурентом 1.4 т/га.
При ціні 450€/т – кінцева різниця – 630 €/га.



ТОВАРНИЙ ПОСІВ - ГІБРИД КОНКУРЕНТ БЕЗ СТІЙКОСТІ ДО РОЗТРИСКУВАННЯ. ВТРАТА ВРОЖАЙНОСТІ БІЛЬШЕ 50%

ДЕМО ПОЛЕ ГІБРИДІВ ЛІМАГРЕЙН. СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТРИСКУВАННЯ МАКСИМАЛЬНО ЗБЕРЕГЛА УРОЖАЙ.

На фото можна побачити яскравий приклад, скільки ми можемо втратити через настання несприятливих погодних умов наприкінці вегетації. Так 19.07.2021 як раз перед збиранням в регіоні пройшли сильні опади з градом, які сприяли розтріскуванню та втраті врожайності на нестійких гібридах до 50-60%, що при ціні 450 Євро/т дорівнювало втратам з 1 га на рівні 750-900 Євро. Натомість, гібриди Лімагрейн витримали дані умови та максимально зберегли свій врожай.

Вінницька обл, с. Ольгопіль. 19.07.2021, після урагану з градом.



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО ВІРУСУ TuYV

ЯК ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ ВІРУС TuYV:

- Фіолетове забарвлення листків
- Низькорослість рослини
- Зменшення площі листової поверхні
- Зменшення кількості зерен в стручку
- Збільшення вмісту глюकोзинолатів
- Зниження вмісту олій
- Зниження врожайності

TuYV або вірус жовтухи турнепсу

одна з важливих причин через яку ріпак не досягає свого генетичного потенціалу. Останнім часом значення та поширення цього вірусу набуло більших масштабів, адже, через ураження **TuYV**, врожайність ріпаку може знижуватись на 10-30%, інколи, при сильному ураженні – навіть до 50%. Якщо взяти до уваги, що розповсюдження **TuYV** відбувається комахами, переважно попелицями, і той факт, що за останні роки ми спостерігаємо аномально теплі осінні та зимові періоди, можемо констатувати, що все це призводить до подовження активності і збільшенню популяцій переносників цього вірусу і відповідно збільшенню шкоди на полях. Найбільшого поширення цей вірус набуває в регіонах вирощування цукрового буряку та поблизу садових насаджень, також, рослинами-господарями висту-

пають багаторічні бур'яни та овочеві культури. Найнебезпечнішим переносником **TuYV** є персикова попелиця, яка після перебування на вищезгаданих культурах переміщується на посіви ріпаку у осінній період і відповідно інфікує рослини. Саму попелицю на рослині побачити дуже важко, адже вона знаходиться під листком, через це і боротьба з нею малоефективна. Але, присутність самої попелиці може вже свідчити про наявність вірусу у рослинах. Але, слід пам'ятати, що симптоми вірусу легко сплутати з іншими: дефіцит азоту або фосфору, гербіцидний вплив, або поверхневе залягання ґрунтових вод. Перевірити наявність зараження допоможуть лабораторні дослідження. Ефективним способом зниження впливу цього вірусу є імунна селекція. Компанія Лімагрейн першою запропонувала для ринку Європи гібриди зі стійкістю до цього вірусу. Одним з перших таких гібридів виступив Архітект, який у попередніх сезонах став найпопулярнішим гібридом ріпаку озимого в Європі. Посівні площі під цим гібридом сягнули позначки у 300 тис. га. Також, така стійкість впроваджується на нові гібриди Лімагрейн. Основною відмінністю цих гібридів є не тільки здатність формувати максимальні врожаї у місцях поширення цього вірусу, а їх унікальна адаптивність та стабільність у різних умовах вирощування. З кожним роком потреби ринку змінюються, запити зростають, і в таких умовах, наша задача відслідковувати тенденції ринку і впроваджувати останні досягнення для підтримки і покращення рівня сільського господарства.

Персикова попелиця та вірус TuYV



LG STEM HEALTH / SCLERO FLEX - НОВІ ГЕНЕТИЧНІ РІШЕННЯ ЛІМАГРЕЙН В СЕЛЕКЦІЇ ОЗИМОГО РІПАКУ



Ключовою складовою для отримання високих показників врожайності ріпака озимого є здоров'я стебла. Вегетаційний період даної рослини складає майже цілий рік, а тому ризик бути ураженим тою чи іншою хворобою дуже великий.

Саме від здоров'я стебла залежить повноцінний ріст та розвиток рослини, адже воно працює за для переміщення вологи, поживних речовин, продуктів фотосинтезу до стручків і далі в насіння. Основний негативний вплив через хвороби проявляється у другій половині вегетації, що дуже сильно впливає на розвиток рослини, кількість сформованих стручків, кількість зерен в стручку, а також на налив зерна і масу 1000 насінин.

Хвороби	Фомоз/Рак стебла (Phoma lingam/ Leptosphaeria maculans)	Циліндроспоріоз (Cylindrosporium concentricum)	Вертицильоз (Verticillium longisporum)	Склеротиніоз (Sclerotinia sclerotiorum)
Сприятливі умови поширення	Тепла та волога погода восени та навесні	Вітряні та дощові умови восени та навесні (5-15 °C)	Легкі ґрунти, середня вологість ґрунту, тепла температура (>20 °C)	Теплі та вологі умови навесні (під час періоду цвітіння)
Вплив на врожайність	Втрата врожаю до 50% у важких випадках	Втрата врожаю до 25% у важких випадках	Втрата врожаю до 30% у важких випадках	Втрата врожаю до 20-30% у важких випадках
Хімічне рішення	Доступний фунгіцид, добра ефективність	Доступний фунгіцид, низька ефективність	Відсутнє хімічне рішення	Доступний фунгіцид, добра ефективність
Генетичне рішення	Доступні гібриди з високим рівнем стійкості/толерантності до комплексу хвороб			

Такі хвороби як фомоз, вертицильоз, циліндроспоріоз, склеротиніоз можуть завдати істотної шкоди рослині, через що втрати врожайності можуть бути критичними. Кожна хвороба проявляється по-різному, відповідно шляхи контролю існують різні. Деякі захворювання можливо уникнути профілактичними заходами, як наприклад використання зваженої сівоzmіни та ефективної боротьби із бур'янами, що мінімізує рівень розмноження та поширення збудників спільних хвороб. Щодо хімічного методу контролю – він може бути ефективний, але можуть бути складнощі з оптимальним періодом застосування препаратів, з іншої сторони не всі хвороби піддаються контролю фунгіцидами. Саме тому, як основний шлях унеможливлення та мінімізації зараження – використання високотолерантних/стійких гібридів.

Нижче можна побачити приклад прорахунку рівня врожайності залежно від здоров'я рослини і кінцевої маси 1000 зерен.

Фактор	Уражена рослина/низька маса 1000 насінин	Здорова рослина/висока маса 1000 насінин
Стручків/м²	5400	5400
К-ть зерен в стручку	15	15
M1000 (г)	3,5	6
Врожайність (т/га)	2,83	4,86

З року в рік компанія Лімагрейн пропонує для ринку нові рішення та селекційні досягнення задля отримання максимально високих та стабільних показників врожайності. В сезоні 2024/25 компанія презентує лінійку гібридів **Stem Health** (здорове стебло), яка поєднає в собі гібриди з комбінацією високого рівня стійкостей та толерантностей до таких хвороб як: вертицильоз, фомоз, циліндроспоріоз. Також, представлені гібриди **Sclero Flex** з високою толерантністю до склеротиніозу для регіонів з високим ризиком поширення цієї хвороби. Всі ці гібриди доповнені стійкістю до вірусу TuYV, а також, як і вся лінійка продуктів Лімагрейн мають генетичну стійкість до розтріскування стручків.



- ЛГ АРНОЛЬД
- ЛГ АДАПТ
- ЛГ ОКЛЕНД
- ЛГ АКАДЕМІК
- ЛГ АДЕЛІН
- ЛГ АТАКАМА
- ЛГ АРМАДА
- ЛГ АВЕНГЕР

ГІБРИДИ STEM HEALTH З МАКСИМАЛЬНОЮ ТОЛЕРАНТНІСТЮ ДО ВЕРТИЦИЛЬОЗУ



Чернігівська обл, 2024, локація з ураженням вертицильозом.

Приклад з гібридом ЛГ Арнольд, який ліворуч від лінії. В даного гібрида стебла зберігли здоровий вигляд до приходу комбайна в поле, натомість у сусіднього гібрида 20% рослин були уражені вертицильозом.

- ЛГ АВЕНГЕР
- ЛГ АРМАДА
- ЛГ АТАКАМА

SCLERO-FLEX - ГІБРИДИ З ВИСОКОЮ ТОЛЕРАНТНІСТЮ ДО СКЛЕРОТИНІОЗУ.



ЛГ Армада.
Колір рослин темно-зелений
Міцне і здорове стебло без ризику вилягання
Висока м 1000
Висока урожайність

Гібрид без толерантності
до склеротиніозу



Освітлений колір рослин (світло-коричневий/
світло-зелений)
Тонке стебло із ризиком вилягання
Низька м 10000
Низька врожайність

УМОВНІ ПОЗНАЧКИ LIMAGRAIN ПО РІПАКАМ

ВИСОКА ЗИМОСТІЙКІСТЬ



СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТРІСКУВАННЯ СТРУЧКІВ



ВИСОКА ПОСУХОСТІЙКІСТЬ



СТІЙКІСТЬ ДО КИЛИ КАПУСТИ



ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ АЗОТУ



ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ



ВИСОКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ



СТІЙКІСТЬ ДО ВІРУСУ ЖОВТУХИ
ТУРНЕПСУ



ВИСОКА ОЛІЙНІСТЬ



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО ФОМОЗУ



ВИСОКА ПРИДАТНІСТЬ ДО РАНИХ
СТРОКІВ СІВБИ



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО ФОМОЗУ



ВИСОКА ПРИДАТНІСТЬ ДО ПІЗНІХ
СТРОКІВ СІВБИ АБО ШВИДКИЙ
ОСІННІЙ РОЗВИТОК



ВИСОКА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО
СКЛЕРОТИНІОЗУ



ВИСОТА РОСЛИНИ



ВИСОКА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО
КОМПЛЕКСУ ЗАХВОРЮВАНЬ





ЩО ТАКЕ N-FLEX?

РІПАК – вибаглива культура до азотного живлення. Для покращення ефективності поглинання доступного азоту рослинами, компанія Limagrain Europe розробила гібриди, які здатні оптимізувати використання доступного азоту та мінімізувати втрати врожаю в неоптимальних умовах живлення.


ДЛЯ ГІБРИДІВ РІПАКУ N-FLEX – ключовим фактором є ефективність використання азоту – це те, наскільки добре рослина засвоює та мобілізує азот із ґрунту, переміщуючи його вгору в стручки і, зрештою, у насіння.

N-FLEX ГІБРИДИ

Це безпека та прогнозованість кінцевого врожаю як в оптимальних умовах вирощування так і в умовах стресу. З даними гібридами ми все одно маємо прагнути досягти оптимально рівня живлення, але, коли складаються критичні фактори, які впливають на використання азоту рослинами, дані гібриди нівелиують ризики та зберігають врожай на максимально високому та прогнозованому рівні.

ГІБРИДИ N-FLEX ХАРАКТЕРИЗУЮТЬСЯ:

- Потужною кореновою системою із швидшим проникненням в глибші шари ґрунту,
- Більш ефективним поглинанням азоту з ґрунту,
- Швидким нарощуванням вегетативної маси,
- Видатним здоров'ям (стійкість до TuYV, толерантність до фомозу, циліндроспоріозу...





N-FLEX ВІД ЛІМАГРЕЙН – УНІКАЛЬНА ГЕНЕТИКА ГІБРИДІВ РІПАКУ З ЕФЕКТИВНИМ ЗАСВОЄННЯМ АЗОТУ

Потенціал
врожайності

Стійкість до
TuYV

N
FLEX
Засвоювання
азоту

Стійкість до
розтріскування



Гібриди **АМБАССАДОР, ЛГ АВІРОН, ЛГ АУСТІН,
ЛГ АНТІГУА, ЛГ АРМАДА, ЛГ АКАДЕМІК**

Нові гібриди ріпаку N-Flex здатні краще та ефективніше
засвоювати азот з ґрунту та переводити його у високу врожайність

www.lgseeds.com.ua





ВІДСТЕЖЕННЯ ІНДЕКСУ NDVI

Динаміка розвитку ріпаку


agrility.VEGETATION

АМБАССАДОР

Дата посіву: 25.08.2022
Локація: Рогатинський р-н,
Івано-Франківська обл.
Площа: 74 га

Зразок знімка: 28.09.2022

Слабка біомаса Сильна біомаса
0,15 0,85



Зразок знімка: 10.10.2022

Слабка біомаса Сильна біомаса
0,15 0,85



Зразок знімка: 9.11.2022

Слабка біомаса Сильна біомаса
0,15 0,85



Зразок знімка: 17.02.2023

Слабка біомаса Сильна біомаса
0,15 0,85



Зразок знімка: 13.04.2023

Слабка біомаса Сильна біомаса
0,15 0,85




Зразок знімка: 16.05.2023

Слабка біомаса Сильна біомаса
0,15 0,85



ЕВОЛЮЦІЯ ВЕГЕТАЦІЙНОГО ІНДЕКСУ

— Середнє по полю



Супутниковий моніторинг індексу рослинності (NDVI Index), на гібриді ріпаку АМБАССАДОР, демонструє потужний розвиток гібриду в осінній період навіть в умовах гетерогенного поля та дефіциту вологи, що впливає на різний період сходів. До настання зими та протягом весняної вегетації, як бачимо, фази розвитку в різних частинах поля набули більш однорідного значення.



PIPAK



НОВИНКА 2025

ЛГ АДАМАНТ

ГІБРИД ЛГ АДАМАНТ - ВИСОКОПРОДУКТИВНИЙ ГІБРИД, З ВИСОКИМИ ПОКАЗНИКАМИ ПОСУХОСТІЙКОСТІ, ВРОЖАЙНОСТІ ТА АДАПТИВНОСТІ. МАЄ СТІЙКІСТЬ ДО ВІРУСУ TuYV, ГЕН СТІЙКОСТІ ДО ФОМОЗУ RLM7 ТА ВИСОКУ ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ВЕРТИЦИЛЬОЗУ. ТАКОЖ, ГІБРИДУ ВЛАСТИВА ВИСОКА ВИТРИВАЛІСТЬ ПРОТИ РІПАКОВОЇ БЛІШКИ.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній

ТЕХНОЛОГІЯ: класичний

ТИП: 00 (безеруковий)

ВМІСТ ГЛЮКОЗИНОЛАТИВ: <15 мМоль/г

ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО TuYV



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО ФОМОЗУ



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТРИСКУВАННЯ СТРУЧКІВ



Осінній розвиток

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Зимостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Весняне відновлення вегетації
середнє



Цвітіння
середньораннє



Посуhostійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Висота рослин

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Стійкість до вилягання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Олійність

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



0 — низький показник, 9 — високий показник


РЕКОМЕНДОВАНА
НОРМА ВИСІВУ:

350-450 тис./га

ТЕРМІНИ
ПОСІВУ:

середньоранні - пізні

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ (Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)





НОВИНКА 2025

ЛГ АВЕНГЕР

ГІБРИД ЛГ АВЕНГЕР ПОЄДНУЄ В СОБІ КОМПЛЕКС СТІЙКОСТЕЙ ТА ВИСОКОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДО ОСНОВНИХ ХВОРОБ, ТАКИХ ЯК СКЛЕРОТИНІОЗ, ВЕРТИЦІЛЬОЗ, ФОМОЗ, ЦИЛІНДРОСПОРІОЗ, TuYV, що дає йому змогу мати високий ІДЕКС ПРОТИДІЇ ХФОРОБАМ ТА ЗДАТНІСТЬ ФОРМУВАТИ МАКСИМАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ВРОЖАЙНОСТІ.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньостиглий

ТЕХНОЛОГІЯ: класичний

ТИП: 00 (безеруковий)

ВМІСТ ГЛЮКОЗИНОЛАТИВ: <15 мМоль/г

**ВИСОКА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО
СКЛЕРОТИНІОЗУ**



**ВИСОКА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО
КОМПЛЕКСУ ЗАХВОРЮВАНЬ**



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО TuYV



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО ФОМОЗУ



**ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО
РОЗТРИСКУВАННЯ СТРУЧКІВ**



Осінній розвиток

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Зимостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Весняне відновлення вегетації
середньопізнє



Цвітіння
середнє



Посухостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Висота рослин

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8,5 | 9 |



Стійкість до вилягання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Олійність

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



0 — низький показник, 9 — високий показник

РЕКОМЕНДОВАНА
НОРМА ВІСІВУ:


350-450 тис./га

ТЕРМІНИ
ПОСІВУ:

середньоранні - пізні

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ

(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)



НОВИНКА 2025

ЛГ АДАПТ

ВИСОКОПРОДУКТИВНИЙ СЕРЕДНЬОСТИГЛИЙ ГІБРИД, З ВИСОКИМИ ПОКАЗНИКАМИ СТІЙКОСТІ ТА ТОЛЕРАНТНОСТІ ДО ОСНОВНИХ ХВОРОБ: ВЕРТИЦИЛЬОЗ, ФОМОЗ, ЦИЛІНДРОСПОРІОЗ, ТУУВ. ГІБРИДУ ХАРАКТЕРНИЙ ПОМІРНИЙ ОСІННІЙ РОЗВИТОК, НЕ СХИЛЬНИЙ ДО ВИТЯГУВАННЯ КОРЕНЕВОЇ ШИЙКИ, МАКСИМАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ЗИМОСТІЙКОСТІ ТА СТІЙКОСТІ ДО ВЕСНЯНИХ ПРИМОРОЗКІВ ЗАВДЯКИ ПІЗНІШИМ ТЕРМІНАМ ВІДНОВЛЕННЯ ВЕСНЯНОЇ ВЕГЕТАЦІЇ ТА ЦВІТІННЮ. ДУЖЕ ВИСОКИЙ ВИХІД ОЛІЇ.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньостиглий

ТЕХНОЛОГІЯ: класичний

ТИП: 00 (безеруковий)

ВМІСТ ГЛЮКОЗИНОЛАТІВ: <15 мМоль/г

ВИСОКА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО КОМПЛЕКСУ ЗАХВОРЮВАНЬ



ВЕРТИЦИЛЬОЗ
ЦИЛІНДРОСПОРІОЗ
ФОМОЗ

ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО ТуУВ



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО ФОМОЗУ



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТРИСКУВАННЯ СТРУЧКІВ



Осінній розвиток

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 |



Зимостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9** |



Весняне відновлення вегетації
середньопізнє



Цвітіння
середньопізнє



Посухостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |



Висота рослин

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8,5** | 9 |



Стійкість до вилягання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9** |



Олійність

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9** |



0 — низький показник, 9 — високий показник

РЕКОМЕНДОВАНА
НОРМА ВИСІВУ:


350-450 тис./га

ТЕРМІНИ
ПОСІВУ:

середньоранні -
середньопізні

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ

(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)



НОВИНКА 2024

ЛГ СКОРПІОН

ГІБРИД З ГЕНЕТИЧНОЮ СТИЙКІСТЮ ДО КИЛИ КАПУСТИ.
ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ВРОЖАЙНОСТІ ЯК В УМОВАХ ПОШИРЕННЯ КИЛИ КАПУСТИ, ТАК І В ЗВИЧАЙНИХ УМОВАХ ВИРОЩУВАННЯ.
ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ ШВИДКИМ ОСІННІМ ТА ВЕСНЯНИМ РОЗВИТКОМ, ВИСОКОЮ ТОЛЕРАНТНІСТЮ ДО ВЕРТИЦИЛЬОЗУ ТА ФОМОЗУ.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній

ТЕХНОЛОГІЯ: класичний

ТИП: 00 (безеруковий)

ПОЗИЦІОНУВАННЯ: регоїни з ризиком поширення Кили капусти (Club root)

ВМІСТ ГЛЮКОЗИНОЛАТІВ: <15 мМоль/г

ГЕНЕТИЧНА СТИЙКІСТЬ ДО TuYV



ГЕНЕТИЧНА СТИЙКІСТЬ ДО ФОМОЗУ



ГЕНЕТИЧНА СТИЙКІСТЬ ДО КИЛИ КАПУСТИ



ГЕНЕТИЧНА СТИЙКІСТЬ ДО РОЗТРИСКУВАННЯ СТРУЧКІВ



Осінній розвиток

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Зимостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Весняне відновлення вегетації
раннє



Цвітіння
раннє



Посухостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7,5 | 8 | 9 |



Висота рослин

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8,5 | 9 |



Стойкість до вилягання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Олійність

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



0 — низький показник, 9 — високий показник

РЕКОМЕНДОВАНА
НОРМА ВІСІВУ:


350-500 тис./га

ТЕРМІНИ
ПОСІВУ:

оптимальні - пізні

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ

(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)



НОВИНКА 2024

ЛГ ОКЛЕНД

ГІБРИД З СИЛЬНИМ ІМУНІТЕТОМ ТА ВИСОКИМИ ПОКАЗНИКАМИ ВРОЖАЙНОСТІ. ВІДМІННО ПІДІЙДЕ В РЕГІОНИ ТА УМОВИ З РИЗИКОМ ПОШИРЕННЯ ОСНОВНИХ ХВОРОБ. ПОТУЖНИЙ ОСІННІЙ РОЗВИТОК ТА ВИСОКА ЗИМОСТІЙКІСТЬ. ВИСОКИЙ ВМІСТ ОЛІЇ - ДОДАТКОВА ПЕРЕВАГА. ВІДМІННО СЕБЕ ПОКАЗУЄ НА ЛЕГКИХ ГРУНТАХ. ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ РІВНОМІРНИМ ДОСТИГАННЯМ НАВІСТІ В УМОВАХ З ПЕРЕПАДАМИ ВИСОТ.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній

ТЕХНОЛОГІЯ: класичний

ТИП: 00 (безеруковий)

ВМІСТ ГЛЮКОЗИНОЛАТІВ: <15 мМоль/г

ВИСОКА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО КОМПЛЕКСУ ЗАХВОРЮВАНЬ



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО TuYV



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО ФОМОЗУ



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТРИСКУВАННЯ СТРУЧКІВ



Осіnnий розвиток

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |



Зимостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9** |



Весняне відновлення вегетації
середньораннє



Цвітіння
середньораннє



Посухостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |



Висота рослин

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8,5** | 9 |



Стійкість до вилягання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 |



Олійність

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9** |



0 — низький показник, 9 — високий показник

**РЕКОМЕНДОВАНА
НОРМА ВІСІВУ:**


350-500 тис./га

**ТЕРМІНИ
ПОСІВУ:**

оптимальні - пізні

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ

(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)





МИСТЕЦТВО ОЛІЙНОСТІ



ЛГ ОКЛЕНД

- Максимальний потенціал врожаю
- Висока олійність
- Відмінне здоров'я
- Стійкість до TuYV

- Stem Health – Висока толерантність до вертицильозу / фомозу / циліндроспоріозу
- Генетична стійкість до розтріскування стручків

www.lgseeds.com.ua





ФЛАГМАН ОЗИМОГО РІПАКУ



ЛГ АРМАДА

- Унікальна комбінація генетичних особливостей.
- Рекордна врожайність
- N-Flex – ефективне використання азоту
- Відмінне здоров'я та витривалість
- Стійкість до вірусу TuYV

- Sclero-Flex - Висока толерантність до склеротиніозу
- Stem Health – Висока толерантність до фомозу / вертицильозу / циліндроспору
- Висока зимостійкість
- Генетична стійкість до розтріскування стручків



www.lgseeds.com.ua



НОВИНКА 2024

ЛГ АРМАДА

НОВА ЗІРКА НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ.

ГІБРИД, ЯКИЙ ПОЄДНУЄ МАКСИМАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ СЕЛЕКЦІЙНИХ ДОСЯГНЕНЬ ТА МАКСИМАЛЬНО ДОПОВНЮЄ ТА СТРАХУЄ ТЕХНОЛОГІЮ В ГОСПОДАРСТВІ. ГІБРИД ПЛАСТИЧНИЙ ДО ТЕРМІНІВ ПОСІВУ, З ВИСОКОЮ ЗИМОСТІЙКІСТЮ ТА СТІЙКІСТЮ ДО ВЕСНЯНИХ ПРИМОРОЗКІВ. ТАКОЖ ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ ЕФЕКТИВНИМ ВИКОРИСТАННЯМ АЗОТУ З ґРУНТУ ТА ПЕРЕВЕДЕННЯМ ЙОГО У ВИСОКІ КІНЦЕВІ ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТИВНОСТІ.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньостиглий

ТЕХНОЛОГІЯ: класичний

ТИП: 00 (безеруковий)

ВМІСТ ГЛЮКОЗИНОЛАТІВ: <15 мМоль/г

**ЕФЕКТИВНЕ
ВИКОРИСТАННЯ
АЗОТУ**



**ГЕНЕТИЧНА
СТІЙКІСТЬ ДО
TuYV**



**ВИСОКА ТОЛЕ-
РАНТНІСТЬ ДО
СКЛЕРОТИНІОЗУ**



**ГЕНЕТИЧНА
СТІЙКІСТЬ ДО
ФОМОЗУ**



**ВИСОКА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО
КОМПЛЕКСУ ЗАХВОРЮВАНЬ**



**ВЕРТИЦИЛЬОЗ
ЦИЛІНДРОСПОРІОЗ
ФОМОЗ**

**ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО
РОЗТРИСКУВАННЯ СТРУЧКІВ**



Осінній розвиток

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Зимостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Весняне відновлення вегетації

середньопізнє



Цвітіння

середньопізнє



Посухостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Висота рослин

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8,5 | 9 |



Стійкість до вилягання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Олійність

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



0 — низький показник, 9 — високий показник

**РЕКОМЕНДОВАНА
НОРМА ВІСІВУ:**


350-500 тис./га

**ТЕРМІНИ
ПОСІВУ:**

середньоранні -
середньопізні

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ

(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)



НОВИНКА 2024

ЛГ АТАКАМА

ГІБРИД З ВИСОКИМИ ТА СТАБІЛЬНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ВРОЖАЙНОСТІ. ОСОБЛИВО ДЕМОНСТРУЄ СВОЮ ПЕРЕВАГУ НАД ІНШИМИ ГІБРИДАМИ В УМОВАХ З ПОШИРЕННЯМ ОСНОВНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ, ТАКИХ ЯКИК: ВЕРТИЦИЛЬОЗ, СКЛЕРОТИНІОЗ, ФОМОЗ, ЦИЛІНДРОСПОРІОЗ. ГІБРИД З ПОДОВЖЕНИМ ПЕРЕОДОМ ВЕГЕТАЦІЇ І, ВІДПОВІДНО ВИСОКИМ ПОТЕНЦІАЛОМ УРОЖАЙНОСТІ. ВИСОКА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ВОВЧКА ГІЛЛЯСТОГО (ОРОВАНСНЕ RAMOSA).

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньопізній

ТЕХНОЛОГІЯ: класичний

ТИП: 00 (безеруковий)

ВМІСТ ГЛЮКОЗИНОЛАТИВ: <15 мМоль/г

**ВИСОКА ТОЛЕ-
РАНТНІСТЬ ДО
СКЛЕРОТИНІОЗУ**



**ГЕНЕТИЧНА
СТІЙКІСТЬ ДО
ФОМОЗУ**



**ВИСОКА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО
КОМПЛЕКСУ ЗАХВОРЮВАНЬ**



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО TuYV



**ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО
РОЗТРИСКУВАННЯ СТРУЧКІВ**



Осінній розвиток

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |



Зимостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9** |



Весняне відновлення вегетації
середнє



Цвітіння
середньопізнє



Посухостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |



Висота рослин

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8,5** | 9 |



Стійкість до вилягання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9** |



Олійність

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |



0 — низький показник, 9 — високий показник

**РЕКОМЕНДОВАНА
НОРМА ВІСІВУ:**


350-500 тис./га

**ТЕРМІНИ
ПОСІВУ:**

оптимальні - пізні

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ

(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)



НОВИНКА 2024

ЛГ АДЕЛІН

СЕРЕДНЬОРАННІЙ ГІБРИД. ПЛАСТИЧНИЙ ДО
ТЕРМІНІВ ПОСІВУ. МАЄ ВИСОКІ ПОКАЗНИКИ
ТОЛЕРАНТНОСТІ ДО ОСНОВНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
(ВЕРТИЦІЛЬОЗ, ЦИЛІНДРОСПОРІОЗ, ФОМОЗ).
ВИСОКІ ПОКАЗНИКИ ЗИМОСТІЙКОСТІ ТА
СТІЙКОСТІ ДО ВЕСНЯНИХ ПРИМОРОКІВ.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній

ТЕХНОЛОГІЯ: класичний

ТИП: 00 (безеруковий)

ВМІСТ ГЛЮКОЗИНОЛАТИВ: <15 мМоль/г

ВИСОКА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО
КОМПЛЕКСУ ЗАХВОРЮВАНЬ



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО TuYV



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО ФОМОЗУ



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО
РОЗТРИСКУВАННЯ СТРУЧКІВ



Осінній розвиток

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Зимостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Весняне відновлення вегетації
середнє



Цвітіння
середнє



Посуhostійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Висота рослин

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8,5 | 9 |



Стійкість до вилягання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Олійність

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



0 — низький показник, 9 — високий показник

РЕКОМЕНДОВАНА
НОРМА ВІСІВУ:


350-500 тис./га

ТЕРМІНИ
ПОСІВУ:

оптимальні - пізні

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ

(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)



НОВИНКА 2024

ЛГ АКАДЕМІК

СЕРЕДНЬОРАННІЙ ШИРОКОАДАПТОВАНИЙ ГІБРИД. ЛГ АКАДЕМІК ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ ШИРОКИМ ПРОФІЛЕМ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДО ОСНОВНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ, ТАКОЖ ГІБРИД ЕФЕКТИВНО ВИКОРИСТОВУЄ АЗОТНЕ ЖИВЛЕННЯ В РІЗНИХ УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ТА ФОРМУЄ СТАБІЛЬНІ, ВИСОКІ ПОКАЗНИКИ ВРОЖАЙНОСТІ.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній

ТЕХНОЛОГІЯ: класичний

ТИП: 00 (безеруковий)

ВМІСТ ГЛЮКОЗИНОЛАТІВ: <15 мМоль/г

ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ АЗОТУ



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО ФОМОЗУ



ВИСОКА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО КОМПЛЕКСУ ЗАХВОРЮВАНЬ



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО TSVV



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТРИСКУВАННЯ СТРУЧКІВ



Осінній розвиток

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |



Зимостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9** |



Весняне відновлення вегетації
середньораннє



Цвітіння
середньораннє



Посухостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |



Висота рослин

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8,5** | 9 |



Стойкість до вилягання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9** |



Олійність

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |



0 — низький показник, 9 — високий показник

**РЕКОМЕНДОВАНА
НОРМА ВІСІВУ:**


350-500 тис./га

**ТЕРМІНИ
ПОСІВУ:**

середньоранні -
середньопізні

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ

(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)





НАУКОВИЙ ПІДХІД – ВРОЖАЙНИЙ ГІБРИД



ЛГ АКАДЕМІК

- Унікальна комбінація генетичних особливостей.
- Рекордна врожайність
- N-Flex – ефективне використання азоту
- Відмінне здоров'я та витривалість
- Стійкість до вірусу TuYV

- Stem Health – Висока толерантність до фомозу / вертицильозу / циліндроспору /
- Висока зимостійкість
- Генетична стійкість до розтріскування стручків



www.lgseeds.com.ua

НОВИНКА 2024

ЛГ АФРОДІТА

ВІДМІННІ ПОКАЗНИКИ ВРОЖАЙНОСТІ ТА
СТАБІЛЬНОСТІ В УМОВАХ ДЕФІЦИТУ ВОЛОГИ
ЯК В ОСІННІЙ ТАК І У ВЕСНЯНО-ЛІТНІЙ ПЕРІОД.
ШВИДКИЙ ОСІННІЙ РОЗВИТОК. ВИСОКА
ПРИДАТНІСТЬ ДО ПІЗНІХ ТЕРМІНІВ ВИСІВУ.
ГІБРИД ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ ПІДВИЩЕНОЮ
СТІЙКІСТЮ ДО УРАЖЕННЯ ЛИЧИНКАМИ
РІПАКОВОЇ БЛІШКИ ПРОТЯГОМ ОСІНЬНОГО
ПЕРІОДУ.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній

ТЕХНОЛОГІЯ: класичний

ТИП: 00 (безеруковий)

ВМІСТ ГЛЮКОЗИНОЛАТИВ: <15 мМоль/г

ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО TuYV



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО ФОМОЗУ



**ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО
РОЗТРИСКУВАННЯ СТРУЧКІВ**



Осінній розвиток

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9** |



Зимостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |



Весняне відновлення вегетації
середньораннє



Цвітіння
середньораннє



Посухостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9** |



Висота рослин

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8,5** | 9 |



Стійкість до вилягання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |



Олійність

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |



0 — низький показник, 9 — високий показник

**РЕКОМЕНДОВАНА
НОРМА ВИСІВУ:**


350-450 тис./га

**ТЕРМІНИ
ПОСІВУ:**

оптимальні - пізні

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ

(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)





ВТІЛЕННЯ ІДЕАЛУ



ЛГ АФРОДИТА



- Високі показники врожайності та стабільності в умовах дефіциту води як в осінній так і в весняно-літній період
- Швидкий осінній розвиток
- Висока придатність до пізніх термінів висіву

- Висока стійкість до вилягання
- Підвищена стійкість до ураження личинками ріпакової блішки протягом осіннього періоду



www.lgseeds.com.ua

ТОВ «Лімагрейн Україна», вул. Тургенєвська, 55, 04050, Київ. тел./факс: +380 44 484 67 76

Limagrain 

2025

АМБАССАДОР

ГІБРИД № 1 В ЄВРОПІ ЗА ПОСІВНИМИ ПЛОЩАМИ. (21/22, 22/23, 23/24, 24/25). N-FLEX ГІБРИД - МАКСИМАЛЬНО ЕФЕКТИВНО ЗАСВОЄ АЗОТ З ҐРУНТУ.

ВИСОКОВОЖАЙНИЙ ТА СТАБІЛЬНИЙ В РІЗНИХ ҐРУНТОВИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВАХ. ГІБРИД - З МАКСИМАЛЬНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ВРОЖАЙНОСТІ В ДЕМО ТА ТОВАРНИХ ПОСІВІВ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній

ТЕХНОЛОГІЯ: класичний

ТИП: 00 (безеруковий)

ВМІСТ ГЛЮКОЗИНОЛАТИВ: <15 мМоль/г

ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ АЗОТУ



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО TuYV



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО ФОМОЗУ



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТРИСКУВАННЯ СТРУЧКІВ



Осінній розвиток

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |



Зимостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9** |



Весняне відновлення вегетації
середнє-середньопізнє



Цвітіння
середньораннє



Посуhostійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |



Висота рослин

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7,5** | 8 | 9 |



Стійкість до вилягання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9** |



Олійність

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |



0 — низький показник, 9 — високий показник

**РЕКОМЕНДОВАНА
НОРМА ВИСІВУ:**


350-450 тис./га

**ТЕРМІНИ
ПОСІВУ:**

оптимальні - пізні

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ

(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)



ЛГ АВІРОН

N-FLEX - ВИСОКОВОЖАЙНИЙ ПРИ РІЗНИХ УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕНOSTІ АЗОТОМ. ВИСОКІ ПОКАЗНИКИ ВРОЖАЙНОСТІ СТРАХУЮТЬСЯ ВИСОКОЮ ЗИМОСТІЙКІСТЮ ТА ПОСУХОСТІЙКІСТЮ ВІДМІННО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНИХ ТА ПІЗНІХ ТЕРМІНІВ ПОСІВУ. ВИДАТНІ ПОКАЗНИКИ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДО ОСНОВНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ. ГІБРИД ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ ПІДВИЩЕНОЮ СТІЙКІСТЮ ДО УРАЖЕННЯ ЛИЧИНКАМИ РІПАКОВОЇ БЛІШКИ ПРОТЯГОМ ОСІНЬОГО ПЕРІОДУ.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній

ТЕХНОЛОГІЯ: класичний

ТИП: 00 (безеруковий)

**РЕКОМЕНДОВАНА
НОРМА ВІСІВУ:**

350-450 тис./га

**ТЕРМІНИ
ПОСІВУ:**

оптимальні - пізні

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ

(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)

ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ АЗОТУ



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО TuYV



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО ФОМОЗУ



**ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО
РОЗТРИСКУВАННЯ СТРУЧКІВ**



Осінній розвиток

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9** |



Зимостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9** |



Весняне відновлення вегетації
середньораннє



Цвітіння
середньораннє



Посуhostійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9** |



Висота рослин

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |



Стійкість до вилягання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 |



Олійність

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |



0 — низький показник, 9 — високий показник

ТОВ «Вєга
Агро», 2023 р.
57,6 ц/га

СТОВ «Іржавецьке»,
2024 р.
55,9 ц/га

ФГ «Грига»,
2024 р.
50,71 ц/га

ТОВ «Контакт Плюс»,
2024 р.
50,1 ц/га

ФГ «Калина», 50 га,
2023 р.
54 ц/га

ППАФ «Дзвони», 2024 р.
59,5 ц/га

СТОВ «Хорост
Плюс», 2024 р.
60,1 ц/га

ФГ «Одарочка»,
2024 р.
49 ц/га

ПСП «Дмитрівка»,
2024 р.
42,7 ц/га

ФГ «Авлос»,
2024 р.
40,8 ц/га

ТОВ «АФ «Едем»,
2024 р.
50,1 ц/га



ЛГ АНТІГУА

СЕРЕДНЬОСТИГЛИЙ **N-FLEX** ГІБРИД, З
ВІДМІННИМ ПОЄДНАННЯМ НАЙБІЛЬШ
ВАЖЛИВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ ОТРИМАННЯ
МАКСИМАЛЬНИХ ВРОЖАЇВ. ВИСОКА
ПРИДАТНІСТЬ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНИХ ТА ПІЗНИХ
ТЕРМІНІВ ВИСІВУ, ВИСОКА ПОСУХОСТІЙКІСТЬ
ТА ЗИМОСТІЙКІСТЬ. ГІБРИД ДЕМОНСТРУЄ
ВИСОКУ АДАПТИВНІСТЬ ДО РІЗНИХ УМОВ
ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ АЗОТОМ, ЩО СПРИЯЄ
СТАБІЛЬНИМ ВРОЖАЯМ НАВІТЬ ЗА ЗМІННИХ
КЛІМАТИЧНИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ УМОВ.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньостиглий

ТЕХНОЛОГІЯ: класичний

ТИП: 00 (безеруковий)

ВМІСТ ГЛЮКОЗИНОЛАТІВ: <15 мМоль/г

ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ АЗОТУ



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО TuYV



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО ФОМОЗУ



**ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО
РОЗТРИСКУВАННЯ СТРУЧКІВ**



Осінній розвиток

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |



Зимостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9** |



Весняне відновлення вегетації
середнє



Цвітіння
середньораннє



Посуhostійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |



Висота рослин

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7,5** | 8 | 9 |



Стійкість до вилягання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |



Олійність

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9** |



0 — низький показник, 9 — високий показник

РЕКОМЕНДОВАНА
НОРМА ВИСІВУ:


350-450 тис./га

ТЕРМІНИ
ПОСІВУ:

оптимальні - пізні

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ

(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)





СИЛЬНИЙ ТА ВИТРИВАЛИЙ N-FLEX



ЛГ АНТИГУА

- N-Flex - високоврожайний при різних умовах забезпеченості азотом
- Високі показники врожайності страхуються високою зимостійкістю та посухостійкістю
- Відмінно підходить для пізніх термінів посіву
- Стійкість до TuYV
- Висока толерантність до фомозу (RLM7)
- Висока толерантність до циліндрспоріозу
- Стійкість до розтріскування стручків

www.lgseeds.com.ua



ЛГ АУСТІН

СЕРЕДНЬОРАННІЙ **N-FLEX** ГІБРИД. ВИСОКІ ПОКАЗНИКИ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДО ОСНОВНИХ ХВОРОБ ТА ВИТРИВАЛОСТІ В РІЗНИХ УМОВАХ ВИРОЩУВАННЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ МАКСИМАЛЬНИХ УРОЖАЇВ. ГІБРИД ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ ПІДВИЩЕНОЮ СТІЙКІСТЮ ДО УРАЖЕННЯ ЛИЧИНКАМИ РІПАКОВОЇ БЛІШКИ ПРОТЯГОМ ОСІНЬНОГО ПЕРІОДУ.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній

ТЕХНОЛОГІЯ: класичний

ТИП: 00 (безеруковий)

ВМІСТ ГЛЮКОЗИНОЛАТІВ: <15 мМоль/г

**РЕКОМЕНДОВАНА
НОРМА ВІСІВУ:**

350-450 тис./га

**ТЕРМІНИ
ПОСІВУ:**

середньоранні -
середньопізні

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ

(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)

ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ АЗОТУ



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО TuYV



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО ФОМОЗУ



**ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО
РОЗТРИСКУВАННЯ СТРУЧКІВ**



Осінній розвиток

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |



Зимостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9** |



Весняне відновлення вегетації
середньораннє



Цвітіння
середньораннє



Посуhostійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9** |



Висота рослин

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |



Стійкість до вилягання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 |




Олійність

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9** |



0 — низький показник, 9 — високий показник





ПОТУЖНИЙ ГІБРИД | N-FLEX



ЛГ АУСТІН **НОВИНКА**

N-Flex гібрид, максимальні врожаї в різних умовах забезпеченості азотом.

Висока Посухостійкість.

Генетична стійкість до TuYV.

Гени стійкості до фомозу Rlm3/7.



www.lgseeds.com.ua

ЛГ АРНОЛЬД

ВІДМІННЕ РІШЕННЯ ДЛЯ РАНЬОГО ВИСІВУ

- НЕ СХИЛЬНИЙ ДО ВИТЯГУВАННЯ ТОЧКИ РОСТУ
 - НИЗЬКА ПОТРЕБА У ВИКОРИСТАННІ РІСТРЕГУЛЯТОРІВ
 - ВІДМІННІ ПОКАЗНИКИ ЗИМОСТІЙКОСТІ ТА СТІЙКОСТІ ДО ВЕСНЯНИХ ПРИМОРОЗКІВ.
- УНІКАЛЬНА КОМБІНАЦІЯ СТІЙКОСТЕЙ ДО ВСІХ ОСНОВНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній

ТЕХНОЛОГІЯ: класичний

ТИП: 00 (безеруковий)

ВМІСТ ГЛЮКОЗИНОЛАТИВ: <15 мМоль/г

ВИСОКА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО КОМПЛЕКСУ ЗАХВОРЮВАНЬ



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО TuYV



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО ФОМОЗУ



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТРИСКУВАННЯ СТРУЧКІВ



Осінній розвиток

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |



Зимостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9** |



Весняне відновлення вегетації
середньопізнє



Цвітіння

середньопізнє



Посухостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |



Висота рослин

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |



Стійкість до вилягання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |



Олійність

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9** |



0 — низький показник, 9 — високий показник

РЕКОМЕНДОВАНА
НОРМА ВИСІВУ:


350-500 тис./га

ТЕРМІНИ
ПОСІВУ:

ранні - середньопізні

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ

(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)





ВІДМІННЕ РІШЕННЯ ДЛЯ РАНЬОГО ВИСІВУ



ЛГ АРНОЛЬД

www.lgseeds.com.ua



ТОВ «Лімагрейн Україна», вул. Тургенєвська, 55, 04050, Київ. тел./факс: +380 44 484 67 76

Limagrain

2025

АРХІТЕКТ

НАЙПОПУЛЯРНИШИЙ ГІБРИД В ЄВРОПІ
(2018, 2019, 2020).

ЗАЙМАЄ ЛІДУЮЧІ ПОЗИЦІЇ В УКРАЇНІ.
ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ ВИСОКОЮ ВРОЖАЙНІСТЮ
ТА ВИДАТНОЮ СТАБІЛЬНІСТЮ В РІЗНИХ
УМОВАХ ВИРОЩУВАННЯ. ВИСОКІ ПОКАЗНИКИ
ЗИМОСТІЙКОСТІ ТА СТІЙКОСТІ ДО ВЕСНЯНИХ
ПРИМОРОЗКІВ.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній

ТЕХНОЛОГІЯ: класичний

ТИП: 00 (безеруковий)

ВМІСТ ГЛЮКОЗИНОЛАТИВ: <15 мМоль/г

РЕКОМЕНДОВАНА
НОРМА ВІСІВУ:

400-500 тис./га

ТЕРМІНИ
ПОСІВУ:

середньоранні -
середньопізні

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ

(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)

ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО **tuYV**



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО
РОЗТРИСКУВАННЯ СТРУЧКІВ



Осінній розвиток

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 |



Зимостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9** |



Весняне відновлення вегетації
середнє



Цвітіння

середнє-середньопізнє



Посухостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |



Висота рослин

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7,5** | 8 | 9 |



Стійкість до вилягання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9** |




Олійність

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |



0 — низький показник, 9 — високий показник





ПОБУДУЙ ІСТОРІЮ ВЛАСНОГО УСПІХУ



АРХІТЕКТ

www.lgseeds.com.ua



АУРЕЛІЯ

ГІБРИД РІПАКУ АУРЕЛІЯ Є СТАБІЛЬНИМ І ПРОДУКТИВНИМ ВИБОРОМ ДЛЯ ФЕРМЕРІВ. ЙОГО ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ І ШКІДНИКІВ, СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ, ГЕНЕТИЧНА АДАПТАЦІЯ ДО РІЗНИХ УМОВ, В ТОМУ ЧИСЛІ ВИДАТНА ЗИМОСТІЙКІСТЬ РОБЛЯТЬ ЙОГО ВІДМІННИМ ВИБОРОМ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО АГРАРІЯ.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній

ТЕХНОЛОГІЯ: класичний

ТИП: 00 (безеруковий)

ВМІСТ ГЛЮКОЗИНОЛАТІВ: <15 мМоль/г

**РЕКОМЕНДОВАНА
НОРМА ВИСІВУ:**

350-450 тис./га

**ТЕРМІНИ
ПОСІВУ:**

оптимальні - пізні

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ

(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)

ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО TuYV



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО ФОМОЗУ



**ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО
РОЗТРИСКУВАННЯ СТРУЧКІВ**



Осінній розвиток

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |



Зимостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9** |



Весняне відновлення вегетації
середньопізнє



Цвітіння
середнє



Посуhostійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |



Висота рослин

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7,5** | 8 | 9 |



Стійкість до вилягання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |




Олійність

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9** |



0 — низький показник, 9 — високий показник





ПЛАСТИЧНИЙ ТА АДАПТИВНИЙ



Область Київська
АТ Миронівське

52,8 ц/га

Область Вінницька
ФГ Одарочка

54,3 ц/га

Область Запорізька
ТОВ Незалежна Аграрна Індустрія

37,8 ц/га



АУРЕЛІЯ

www.lgseeds.com.ua



АРТЕМІС

ГІБРИД РІПАКУ АРТЕМІС Є ВІДМІННИМ
ВАРІАНТОМ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ В УКРАЇНІ
ЗАВДЯКИ СВОЇЙ СТИЙКОСТІ ДО ХВОРОБ,
ВИСОКІЙ ВРОЖАЙНОСТІ ТА ЗДАТНОСТІ
АДАПТУВАТИСЯ ДО РІЗНИХ КЛІМАТИЧНИХ ТА
ТЕХНОЛОГІЧНИХ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній

ТЕХНОЛОГІЯ: класичний

ТИП: 00 (безеруковий)

ВМІСТ ГЛЮКОЗИНОЛАТІВ: <15 мМоль/г

**РЕКОМЕНДОВАНА
НОРМА ВИСІВУ:**

350-500 тис./га

**ТЕРМІНИ
ПОСІВУ:**

середньоранні -
середньопізні

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ
(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)

ГЕНЕТИЧНА СТИЙКІСТЬ ДО TuYV



ГЕНЕТИЧНА СТИЙКІСТЬ ДО ФОМОЗУ



**ГЕНЕТИЧНА СТИЙКІСТЬ ДО
РОЗТРИСКУВАННЯ СТРУЧКІВ**



Осінній розвиток

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |



Зимостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9** |



Весняне відновлення вегетації
середньопізнє



Цвітіння

середньопізнє



Посухостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |



Висота рослин

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |



Стойкість до вилягання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |




Олійність

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9** |



0 — низький показник, 9 — високий показник





РІПАК НОВОГО ПОКОЛІННЯ



ARTEMIC



www.lgseeds.com.ua

АБСОЛЮТ

**СЕРЕДНЬОСТИГЛИЙ ГІБРИД НОВОГО ПОКОЛІННЯ
З ВРАЖАЮЧИМИ ПОКАЗНИКАМИ
АДАПТИВНОСТІ ТА ВРОЖАЙНОСТІ.
МАКСИМАЛЬНО РОЗКРИВАЄ СВІЙ ПОТЕНЦІАЛ В
ІНТЕНСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ ВИРОЩУВАННЯ.**

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньостиглий

ТЕХНОЛОГІЯ: класичний

ТИП: 00 (безеруковий)

ВМІСТ ГЛЮКОЗИНОЛАТІВ: <15 мМоль/г

**РЕКОМЕНДОВАНА
НОРМА ВІСІВУ:**

350-450 тис./га

**ТЕРМІНИ
ПОСІВУ:**

середньорані - пізні

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ (Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)

ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО TuYV



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО ФОМОЗУ



**ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО
РОЗТРИСКУВАННЯ СТРУЧКІВ**



Осінній розвиток

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |



Зимостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9** |



Весняне відновлення вегетації
середньораннє



Цвітіння

середньораннє



Посухостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |



Висота рослин

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |



Стойкість до вилягання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |




Олійність

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |



0 — низький показник, 9 — високий показник





АБСОЛЮТ

www.lgseeds.com.ua



АННІСТОН

СЕРЕДНЬОРАННІЙ ГІБРИД ІЗ ВИСОКИМ ПОТЕНЦІАЛОМ УРОЖАЙНОСТІ. РОЗКРИВАЄТЬСЯ В ІНТЕНСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ ВИРОЩУВАННЯ. ВИСОКА КОМПЕНСАТОРНА ЗДАТНІСТЬ – ВИТРИМУЄ ЗРІДЖЕНІ УМОВИ ТА ВІДМІННО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ШИРОКОРЯДНИХ ПОСІВІВ. МАЄ ВІДМІННУ КОМБІНАЦІЮ СТИЙКОСТЕЙ ДО ХВОРОБ.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній

ТЕХНОЛОГІЯ: класичний

ТИП: 00 (безеруковий)

ВМІСТ ГЛЮКОЗИНОЛАТІВ: <15 мМоль/г

**РЕКОМЕНДОВАНА
НОРМА ВІСІВУ:**

350-450 тис./га

**ТЕРМІНИ
ПОСІВУ:**

середньорані - пізні

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ

(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)

ГЕНЕТИЧНА СТИЙКІСТЬ ДО TuYV



ГЕНЕТИЧНА СТИЙКІСТЬ ДО ФОМОЗ



**ГЕНЕТИЧНА СТИЙКІСТЬ ДО
РОЗТРИСКУВАННЯ СТРУЧКІВ**



Осіnnий розвиток

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |



Зимостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9** |



Весняне відновлення вегетації
середньораннє



Цвітіння

середньораннє



Посуhostійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9** |



Висота рослин

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7,5** | 8 | 9 |



СтиЙкість до вилягання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 |




Олійність

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |



0 — низький показник, 9 — високий показник





ПІД КЛАСИЧНУ
ТЕХНОЛОГІЮ



АЛЕКСАНДЕР

ГІБРИД ВІДМІННО АДАПТОВАНИЙ ДЛЯ
РАННІХ ТА ОПТИМАЛЬНИХ ТЕРМІНІВ ВІСІВУ.
ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ ВИСОКИМИ ПОКАЗНИКАМИ
ЗИМОСТІЙКОСТІ ТА СТІЙКОСТІ ДО ВЕСНЯНИХ
ПРИМОРОЗКІВ. РЕАЛІЗУЄ ВИСОКИЙ ПОТЕНЦІАЛ
УРОЖАЙНОСТІ В РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ
ВИРОЩУВАННЯ.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній

ТЕХНОЛОГІЯ: класичний

ТИП: 00 (безеруковий)

ВМІСТ ГЛЮКОЗИНОЛАТІВ: <15 мМоль/г

РЕКОМЕНДОВАНА
НОРМА ВІСІВУ:

400-500 тис./га

ТЕРМІНИ
ПОСІВУ:

ранні - середньопізні

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ
(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)

ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО ФОМОЗУ



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО
РОЗТРИСКУВАННЯ СТРУЧКІВ



Осінній розвиток

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Зимостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Весняне відновлення вегетації
середнє



Цвітіння
середньораннє



Посуhostійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Висота рослин

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Стійкість до вилягання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |




Олійність

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



0 — низький показник, 9 — високий показник



НОВИНКА 2025

ЛГ КОНСАЛТ КЛ

НОВИНКА В СЕЗОНІ 2025 ДЛЯ ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ CLEARFIELD®. ГІБРИД ПОЄДНУЄ В СОБІ ВІДДМІННИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ, ПОТУЖНИЙ ІМУНІТЕТ, ВКЛЮЧАЮЧИ ВИСОКУ ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ВЕРТИЦИЛЬОЗУ, СТІЙКІСТЬ ДО ВІРУСУ TuYV, ГЕН СТІЙКОСТІ ДО ФОМОЗУ RLM7 ТА ВИСОКИЙ ВИХІД ОЛІЇ.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній

ТЕХНОЛОГІЯ: Clearfield

ТИП: 00 (безеруковий)

ВМІСТ ГЛЮКОЗИНОЛАТИВ: <15 мМоль/г

ВИСОКА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО КОМПЛЕКСУ ЗАХВОРЮВАНЬ



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО TuYV



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО ФОМОЗ



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТРИСКУВАННЯ СТРУЧКІВ



Осінній розвиток

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |



Зимостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9** |



Весняне відновлення вегетації
середньораннє



Цвітіння
середньораннє



Посухостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |



Висота рослин

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7,5 | **8,5** | 9 |



Стійкість до вилягання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 |



Олійність

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9** |



0 — низький показник, 9 — високий показник

**РЕКОМЕНДОВАНА
НОРМА ВІСІВУ:**


350-500 тис./га

**ТЕРМІНИ
ПОСІВУ:**

оптимальні - пізні

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ

(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)



Clearfield* - зареєстрована торгова марка компанії BASF.(r)2024 BASF.Усі права захищено.



НОВИНКА 2024

ЛГ КЕЛЬВІН КЛ

НОВИНКА ДЛЯ ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ CLEARFIELD®. ГІБРИД ВІДМІННО СЕБЕ ЗАРЕКОМЕНДУВАВ У ВИПРОБУВАННЯХ В КОНТИНЕНТАЛЬНИХ УМОВАХ ЄВРОПИ ТА УКРАЇНИ. МАКСИМАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ВРОЖАЙНОСТІ ДОСЯГАЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК СТІЙКОСТІ ДО ВІРУСУ TuYV, ЕФЕКТИВНОМУ ВИКОРИСТАННЮ АЗОТУ, ВИСОКІЙ ЗИМОСТІЙКОСТІ ТА ПОСУХОСТІЙКОСТІ. ВІДМІННО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ МІНІМАЛЬНИХ ОБРОБІТКІВ ТА ШИРОКОРЯДНИХ ПОСІВІВ.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній

ТЕХНОЛОГІЯ: Clearfield

ТИП: 00 (безеруковий)

ВМІСТ ГЛЮКОЗИНОЛАТІВ: <15 мМоль/г

ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО TuYV



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО ФОМОЗУ



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТРИСКУВАННЯ СТРУЧКІВ



Осіnnий розвиток

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |



Зимостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9** |



Весняне відновлення вегетації

середнє-середньопізнє



Цвітіння

середньораннє



Посухоустійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9** |



Висота рослин

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7,5** | 8 | 9 |



Стійкість до вилягання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9** |




Олійність

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |



0 — низький показник, 9 — високий показник



**РЕКОМЕНДОВАНА
НОРМА ВІСІВУ:**


300-450 тис./га

**ТЕРМІНИ
ПОСІВУ:**

середньоранні -
середньопізні

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ

(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)



Clearfield* - зареєстрована торгова марка компанії BASF.(r)2024 BASF.Усі права захищено.

НОВИНКА 2024

ЛГ КРИПТО КЛ

НОВИЙ ВИСОКОВОЖАЙНИЙ ПРОДУКТ ПІД ВИРОБНИЧУ СИСТЕМУ CLEARFIELD®. ШВИДКИЙ ОСІННІЙ ТА ВЕСНЯНИЙ РОЗВИТОК. ГІБРИД ВІДМІННО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНИХ ТА ПІЗНІХ ТЕРМІНІВ ПОСІВУ. ВИСОКІ ПОКАЗНИКИ ЗИМОСТІЙКОСТІ. ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ ВИСОКИМИ ПОКАЗНИКАМИ ПОСУХОСТІЙКОСТІ У ВЕСНЯНО-ЛІТНІЙ ПЕРІОД. ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО ФОМОЗУ (RLM3/7). ЕФЕКТИВНО ВИКОРИСТОВУЄ АЗОТ ТА ПІДХОДИТЬ ДЛЯ РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній

ТЕХНОЛОГІЯ: Clearfield

ТИП: 00 (безеруковий)

ВМІСТ ГЛЮКОЗИНОЛАТІВ: <15 мМоль/г

ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО TuYV



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО ФОМОЗУ



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТРИСКУВАННЯ СТРУЧКІВ



Осінній розвиток

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Зимостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Весняне відновлення вегетації
середньораннє



Цвітіння
середньораннє



Посуhostійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Висота рослин

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Стійкість до вилягання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Олійність

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



0 — низький показник, 9 — високий показник

**РЕКОМЕНДОВАНА
НОРМА ВІСІВУ:**


300-450 тис./га

**ТЕРМІНИ
ПОСІВУ:**

оптимальні - пізні

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ

(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)



Clearfield* - зареєстрована торгова марка компанії BASF.(r)2024 BASF.Усі права захищено.



БУДЬ В ТРЕНДІ ЗРОСТАННЯ



ЛГ КРИПТО КЛ

- Новинка для виробничої системи Clearfield®
- Максимальна продуктивність
- Висока посухостійкість

- Висока стійкість до фомозу (RLM7+RLM3)
- Висока стійкість до розтріскування стручків.

*Clearfield® – зареєстрована торгова марка компанії BASF. © 2024 BASF. Усі права захищено.

www.lgseeds.com.ua

 **Clearfield®**
Виробнича система



ТОВ «Лімагрейн Україна», вул. Тургенєвська, 55, 04050, Київ. тел./факс: +380 44 484 67 76

Limagrain 

2025

ЛГ КОНСТРУКТОР КЛ

ВІДМІННЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ CLEARFIELD® УНІКАЛЬНИЙ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ ГІБРИД ЯКИЙ НА ВСІХ ЕТАПАХ РОСТУ І РОЗВИТКУ ДЕМОНСТРУЄ ВИСОКУ АДАПТИВНІСТЬ ТА СТІЙКІСТЬ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ОСНОВНИХ ШКОДОЧИННИХ ТА ЛІМІТУЮЧИХ ЧИННИКІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄТЬСЯ ВИСОКИМ РІВНЕМ ВРОЖАЙНОСТІ ТА СТАБІЛЬНОСТІ. НАЙПОПУЛЯРНІШИЙ ГІБРИД В УКРАЇНІ В СЕГМЕНТІ CLEARFIELD® В СЕЗОНІ 24/25.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній

ТЕХНОЛОГІЯ: Clearfield

ТИП: 00 (безеруковий)

ВМІСТ ГЛЮКОЗИНОЛАТІВ: <15 мМоль/г

ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО TuYV



ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТРИСКУВАННЯ СТРУЧКІВ



Осінній розвиток

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 |



Зимостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9** |



Весняне відновлення вегетації
середнє - середньопізнє



Цвітіння

середнє - середньопізнє



Посухостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9** |



Висота рослин

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7,5** | 8 | 9 |



Стійкість до вилягання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9** |



Олійність

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |



0 — низький показник, 9 — високий показник

**РЕКОМЕНДОВАНА
НОРМА ВІСІВУ:**


400-500 тис./га

**ТЕРМІНИ
ПОСІВУ:**

середньоранній -
середньопізній

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ

(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)



Clearfield* - зареєстрована торгова марка компанії BASF.(r)2024 BASF.Усі права захищено.



КАРЛТОН КЛ

ВІДМІННЕ ПОЄДНАННЯ СЕЛЕКЦІЙНИХ ДОСЯГНЕНЬ ДЛЯ ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ CLEARFIELD®. ПІДХОДИТЬ ЯК ДЛЯ ЗВИЧАЙНИХ ТАК І ДЛЯ ШИРОКОРЯДНИХ ПОСІВІВ
ВИСОКА СТАБІЛЬНІСТЬ В ПОСУШЛИВИХ УМОВАХ.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній

ТЕХНОЛОГІЯ: Clearfield

ТИП: 00 (безеруковий)

ВМІСТ ГЛЮКОЗИНОЛАТІВ: <15 мМоль/г

**РЕКОМЕНДОВАНА
НОРМА ВІСІВУ:**

350-450 тис./га

**ТЕРМІНИ
ПОСІВУ:**

оптимальні - пізні

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ
(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)

ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО ФОМОЗУ



**ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО
РОЗТРИСКУВАННЯ СТРУЧКІВ**



Осінній розвиток

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |



Зимостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |



Весняне відновлення вегетації
середньораннє



Цвітіння
середньораннє



Посухостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |



Висота рослин

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 |



Стійкість до вилягання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |




Олійність

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 |



0 — низький показник, 9 — високий показник



Clearfield* - зареєстрована торгова марка компанії
BASF.(r)2024 BASF.Усі права захищено.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ГІБРИДІВ

ГІБРИД	ЛГ АДАМАНТ	ЛГ АВЕНГЕР	ЛГ АДАПТ	ЛГ СКОРПІОН	ЛГ ОКЛЕНД	ЛГ АРМАДА	ЛГ АТАКАМА	ЛГ АДЕЛІН	ЛГ АКАДЕМІК	ЛГ АФРОДИТА	АМБАСАДОР	ЛГ АВІРОН
	НОВИНКА 2025	НОВИНКА 2025	НОВИНКА 2025	НОВИНКА 2024	НОВИНКА 2024	НОВИНКА 2024	НОВИНКА 2024	НОВИНКА 2024	НОВИНКА 2024	НОВИНКА 2024		
Група стиглості	СР	С	С	СР	СР	С	СП	СР	СР	СР	СР	СР
Технологія	класичний	класичний	класичний	класичний	класичний	класичний	класичний	класичний	класичний	класичний	класичний	класичний
Тип	00 (безеруковий)	00 (безеруковий)	00 (безеруковий)	00 (безеруковий)	00 (безеруковий)	00 (безеруковий)	00 (безеруковий)	00 (безеруковий)	00 (безеруковий)	00 (безеруковий)	00 (безеруковий)	00 (безеруковий)
АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ												
Осінній розвиток	8	8	7	9	8	7	8	8	8	9	8	9
Зимостійкість	9	9	9	8	9	9	9	9	9	8	9	9
Весняне відновлення вегетації	С	СП	СП	Р	СР	СП	С	С	СР	СР	С-СП	СР
Цвітіння	СР	С	СП	Р	СР	СП	СП	С	СР	СР	СР	СР
Посухостійкість	9	8	8	7,5	8	8	8	9	8	9	8	9
Висота рослин	8	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	7,5	8
Стійкість до вилягання	9	9	9	8	7	9	9	9	9	8	9	7
ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ												
Вміст глюкозинолатів	<15 мМоль/г	<15 мМоль/г	<15 мМоль/г	<15 мМоль/г	<15 мМоль/г	<15 мМоль/г	<15 мМоль/г	<15 мМоль/г	<15 мМоль/г	<15 мМоль/г	<15 мМоль/г	<15 мМоль/г
Олійність	9	9	9	8	9	8	8	8	8	8	8	8
ПОСІВ												
Терміни посіву	СР-П	СР-П	Р-СП	О-П	О-П	СР-СП	О-П	О-П	СР-СП	О-П	О-П	О-П
Норма висіву тис/га	350-450	350-450	350-450	350-500	350-500	350-500	350-500	350-500	350-500	350-450	350-450	350-450
БЕЗПЕКА ВРОЖАЮ												
Stem Health (висока толерантність до вертицилозу, фомозу, циліндроспоріозу)	—	+	+	—	+	+	+	+	+	—	—	—
N-Flex	—	—	—	—	—	+	—	—	+	—	+	+
Sclero-Flex (Висока толерантність до склеротиніозу)	—	+	—	—	—	+	+	—	—	—	—	—
Стійкість до TuYV	Генетична стійкість	Генетична стійкість	Генетична стійкість	Генетична стійкість	Генетична стійкість	Генетична стійкість	Генетична стійкість	Генетична стійкість	Генетична стійкість	Генетична стійкість	Генетична стійкість	Генетична стійкість
Фомоз	RLM7	RLM7	RLM7	RLM7	RLM7	RLM7	RLM7	RLM7	RLM7	RLM7	RLM7	RLM3 RLM7
Стійкість до Киля Капусти	—	—	—	Генетична стійкість	—	—	—	—	—	—	—	—
Стійкість до розтріскування стручків	Генетична стійкість	Генетична стійкість	Генетична стійкість	Генетична стійкість	Генетична стійкість	Генетична стійкість	Генетична стійкість	Генетична стійкість	Генетична стійкість	Генетична стійкість	Генетична стійкість	Генетична стійкість

Середньостиглий /Середнє = С
Середньоранній = СР
Середньопізній = СП
Середнє-середньопізнє = С-СП
Оптимальні - пізні = ОП
Середньоранні - середньопізні = СР-СП
Ранні - середньопізні = Р-СП

ОЗИМОГО РІПАКУ КОМПАНІЇ «ЛІМАГРЕЙН»

ЛГ АНТІГА	ЛГ АУСТІН	ЛГ АРНОЛЬД	АРХІТЕКТ	АУРЕЛІЯ	АРТЕМІС	АБСОЛЮТ	АННІСТОН	АЛЕКСАНДЕР	ЛГ КОНСАЛТ КЛ	ЛГ КЕЛЬВІН КЛ	ЛГ КРИПТО КЛ	ЛГ КОНСТРУКТОР КЛ	КАРЛТОН КЛ
									НОВИНКА 2025	НОВИНКА 2024	НОВИНКА 2024		
С	СР	СР	СР	СР	СР	С	СР	СР	СР	СР	СР	СР	СР
класичний	класичний	класичний	класичний	класичний	класичний	класичний	класичний	класичний	Clearfield®	Clearfield®	Clearfield®	Clearfield®	Clearfield®
00 (безеруковий)	00 (безеруковий)	00 (безеруковий)	00 (безеруковий)	00 (безеруковий)	00 (безеруковий)	00 (безеруковий)	00 (безеруковий)	00 (безеруковий)	00 (безеруковий)	00 (безеруковий)	00 (безеруковий)	00 (безеруковий)	00 (безеруковий)
АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ													
8	8	6	7	8	7-8	8	8	6	8	8	8	7	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8
С	СР	СП	С	СП	СП	СР	СР	С	СР	С-СП	СР	С-СП	СР
СР	СР	СП	С-СП	С	СП	СР	СР	СР	СР	СР	СР	С-СП	СР
8	9	8	8	8	8	8	9	8	8	9	9	9	8
7,5	8	8	7,5	7,5	8	8	7,5	7	8,5	7,5	8	7,5	7
8	7	8	9	8	8	8	7	8	7	9	7	9	8
ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ													
<15 мМоль/г	<15 мМоль/г	<15 мМоль/г	<15 мМоль/г	<15 мМоль/г	<15 мМоль/г	<15 мМоль/г	<15 мМоль/г	<15 мМоль/г	<15 мМоль/г	<15 мМоль/г	<15 мМоль/г	<15 мМоль/г	<15 мМоль/г
9	9	9	8	9	9	8	8	8	9	8	8	8	7
ПОСІВ													
О-П	СР-СП	Р-О	СР-СП	О-П	СР-СП	СР-П	СР-П	Р-СП	О-П	СР-СП	О-П	СР-СП	ОП-П
350-450	350-450	350-450	400-500	350-450	350-500	350-450	350-450	400-500	350-500	350-450	300-450	400-500	350-450
БЕЗПЕКА ВРОЖАЮ													
-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Генетична стійкість	Генетична стійкість	Генетична стійкість	Генетична стійкість	Генетична стійкість	Генетична стійкість	Генетична стійкість	Генетична стійкість	-	Генетична стійкість	Генетична стійкість	Генетична стійкість	Генетична стійкість	-
RLM7	RLM3 RLM7	RLM7	-	RLM7	RLM7	RLM7	RLM7	RLM7	RLM7	RLM7	RLM3 RLM7	-	RLM7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Генетична стійкість	Генетична стійкість	Генетична стійкість	Генетична стійкість	Генетична стійкість	Генетична стійкість	Генетична стійкість	Генетична стійкість	Генетична стійкість	Генетична стійкість	Генетична стійкість	Генетична стійкість	Генетична стійкість	Генетична стійкість

Терміни посіву:
Р - Ранні
СР - Середньоранні
О - Оптимальні
СП - Середньопізні
П - Пізні

3EPHOBI





СЕЛЕКЦІЯ ЗЕРНОВИХ



На сьогоднішній день ринок сільського господарства в країні розвивається дуже швидкими темпами, ринок технологій та кваліфікацій також росте. І, відповідно, як селекційна компанія, ми повинні підтримувати цей розвиток, виводячи на ринок нові високопродуктивні сорти та гібриди. Метою компанії є підвищення рівня врожайності та якості своєї продукції.

Так, в сезоні 21/22 компанія Лімагрейн зайняла перше місце в Європі в сегменті пшениці озимої (за обсягами реалізації сертифікованого насіння в тоннах). Портфоліо Лімагрейн в Європі включає понад 100 сортів озимої пшениці, які охоплюють усі сегменти якості (кормові, хлібопекарські, кондитерські...) із широким діапазоном стійкостей до біотичних та абіотичних стресів. Стійкість до хвороб і підвищення врожайності сортів у сільгоспкультур – найважливіші аспекти роботи селекціонерів компанії Лімагрейн. Однак, наші вчені враховують і потреби переробної промисловості. Тому вони працюють над вдосконаленням господарсько-корисних ознак сільгоспкультур.

Для України компанія Лімагрейн дуже ретельно підбирає сортовий склад, враховуючи усі особливості наших кліматичних зон, а також потреби аграріїв.

Так, для виведення нових сортів для України, по всій території нашої неньки ми впровадили

дослідні центри у різних ґрунтово-кліматичних умовах, на яких проводиться тестування десятків різних сортів озимої пшениці з метою відбору найкращого матеріалу для континентальних умов країни.

На ринку ярого ячменю робимо акцент на пивоварні сорти, а саме: добре відомі сорти Одиссей, Овертур, а також новинки, такі як ЛГ Тосса, ЛГ Фламенко, ЛГ Бельканто, які характеризуються не тільки високою урожайністю, а й високими якісними показниками для пивоварної галузі, за які сьогодні суттєво доплачують.

В сегменті озимого ячменю сорти Каліфорнія, Казанова за останні роки відмінно зарекомендували себе, та є добре відомі українському виробнику. Також, протягом 3 років ми зареєстрували нові високопродуктивні та високоадаптивні для умов України продукти, такі як ЛГ Зебра, ЛГ Кастінг, ЛГ Тріумф, які мають допомогти аграріям подолати нові виклики на шляху до отримання нових рекордів на полях.

На цьому робота команди Лімагрейн не зупиняється, з кожним наступним роком на ринок будуть заходити ще більш врожайні, адаптовані під наші умови та потреби нові сорти та гібриди, з якими, Ви виробники, зможете отримувати максимальні врожайності та прибутки.



НОРМА
ВИСІВУ:
3-4,5 млн/га

ЛГ ОПТИМІСТ

Високоврожайний сорт з високими показниками якості. А група. Висока толерантність до фузаріозу колоса. Пластичний до термінів посіву. Добра зимостійкість. Компенсаційний тип.

ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО ЛАМКОСТІ СТЕБЛА.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньостиглий

РІЗНОВИД: безоста

КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ: Німеччина

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Полісся, Лісостеп

ТЕРМІНИ ПОСІВУ: середньоранні - середньопізні

ВИСОТА РОСЛИНИ: середньорослий (80-85 см)

ГРУПА ЯКОСТІ: А (цінна)

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |

Посухостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7,5** | 8 | 9 |

Стійкість до вилягання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7,5** | 8 | 9 |

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Септоріоз листа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7,5** | 8 | 9 |

Борошниста роса

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |

Фузаріоз колоса

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |

Жовта іржа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |

Бура іржа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |

0 — низький показник, 9 — високий показник

НОРМА
ВИСІВУ:
3,5-4,7 млн/га

ЛГ КЕРАМІК

Відмінна комбінація високого рівня врожайності, високої толерантності до хвороб та високих якісних показників.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній

РІЗНОВИД: безоста

КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ: Німеччина

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Полісся, Лісостеп

ТЕРМІНИ ПОСІВУ: ранні - середньопізні

ВИСОТА РОСЛИНИ: середньорослий (80-85 см)

ГРУПА ЯКОСТІ: А (цінна)

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |

Посухостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |

Стійкість до вилягання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Септоріоз листа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |

Борошниста роса

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |

Фузаріоз колоса

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 |

Жовта іржа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |

Бура іржа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |

0 — низький показник, 9 — високий показник



НОРМА
ВИСІВУ:
3,5-5 млн/га

ЛГ АБСАЛОН

Ранній сорт з високими та стабільними показниками врожайності, якості та посухостійкості. Має високі показники здоров'я. Підходить для мінімальних технологій обробітку.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: ранній

РІЗНОВИД: безоста

КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ: Франція

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Полісся, Лісостеп, Північний Степ

ТЕРМІНИ ПОСІВУ: середньоранні-середньопізні

ВИСОТА РОСЛИНИ: середньорослий (85 см)

ГРУПА ЯКОСТІ: А (цінна) - В (хлібопекарська)

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Посухостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8,5 | 9 |

Стійкість до вилягання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Септоріоз листя

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Борошниста роса

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Фузаріоз колоса

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Жовта іржа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Бура іржа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

0 — низький показник, 9 — високий показник

НОРМА
ВИСІВУ:
3,5-5 млн/га

ЛГ АБРАЦО

Сорт з відмінними показниками адаптивності для умов центрально південної частини України. Напівкарликовий сорт ранньої групи стиглості з остистим типом колосу.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: ранній

РІЗНОВИД: остистий

КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ: Франція

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Лісостеп, Північний степ

ТЕРМІНИ ПОСІВУ: середньоранні-середньопізні

ВИСОТА РОСЛИНИ: напівкарлик (65-70см)

ГРУПА ЯКОСТІ: А (цінна) - В (хлібопекарська)

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6,5 | 7 | 8 | 9 |

Посухостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8,5 | 9 |

Стійкість до вилягання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Септоріоз листя

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Борошниста роса

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Фузаріоз колоса

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Жовта іржа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Бура іржа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

0 — низький показник, 9 — високий показник



НОРМА
ВИСІВУ:
4-5 млн/га

АВЕНЮ

Ультраранній, напівкарликовий, продовольчий сорт озимої пшениці групи - В. Оптимальний попередник для озимого ріпаку та проміжних культур.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: ультраранній

РІЗНОВИД: безоста

КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ: Франція

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Полісся, Лісостеп, Північний Степ

ТЕРМІНИ ПОСІВУ: середньоранні - середньопізні

ВИСОТА РОСЛИНИ: напівкарлик (70 см)

ГРУПА ЯКОСТІ: В (хлібопекарська)

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Посухостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Стійкість до вилягання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Септоріоз листя

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Борошниста роса

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Фузаріоз колоса

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Жовта іржа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Бура іржа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

0 — низький показник, 9 — високий показник

НОРМА
ВИСІВУ:
3,5-5 млн/га

ЛГ РОЗАРКА

Широкоадаптивний сорт в умовах України. Відмінна комбінація рівня врожайності, здоров'я та якісних показників. Висока зимостійкість та посухостійкість.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: ранній-середньоранній

РІЗНОВИД: безоста

КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ: Чехія

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Лісостеп, Північний степ

ТЕРМІНИ ПОСІВУ: середньоранні - середньопізні

ВИСОТА РОСЛИНИ: середньорослий (80-85 см)

ГРУПА ЯКОСТІ: А (цінна)

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Посухостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8,5 | 9 |

Стійкість до вилягання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Септоріоз листя

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Борошниста роса

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Фузаріоз колоса

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Жовта іржа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Бура іржа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

0 — низький показник, 9 — високий показник



НОРМА
ВИСІВУ:
3,5-4,5 млн/га

ЛГ АРАГОНІТ

Сорт середньої групи стиглості з високими показниками якості. Потужне кущення. Високі показники здоров'я та врожайності у зоні лісостепу та полісся.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньостиглий

РІЗНОВИД: безоста

КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ: Німеччина

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Полісся, Лісостеп

ТЕРМІНИ ПОСІВУ: середньоранні - середньопізні

ВИСОТА РОСЛИНИ: високорослий (90 см)

ГРУПА ЯКОСТІ: А (цінна)

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |

Посухостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7,5** | 8 | 9 |

Стійкість до вилягання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Септоріоз листа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 |

Борошниста роса

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |

Фузаріоз колоса

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |

Жовта іржа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |

Бура іржа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |

0 — низький показник, 9 — високий показник

НОРМА
ВИСІВУ:
3,5-5 млн/га

ЛГ КВІТУМ

Середньоранній безостий сорт німецького походження. Характеризується високими показниками врожайності, зимостійкості та високими адаптивними показниками.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній

РІЗНОВИД: безоста

КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ: Німеччина

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Полісся, Лісостеп

ТЕРМІНИ ПОСІВУ: середньоранні - середньопізні

ВИСОТА РОСЛИНИ: середньорослий (80-85 см)

ГРУПА ЯКОСТІ: В (хлібопекарська)

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |

Посухостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7,5** | 8 | 9 |

Стійкість до вилягання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9** |

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Септоріоз листа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 |

Борошниста роса

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 |

Фузаріоз колоса

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |

Жовта іржа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |

Бура іржа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |

0 — низький показник, 9 — високий показник



НОРМА
ВИСІВУ:
3,5-4,7 млн/га

ЛГ ЕГМОНТ

Середньостиглий сорт з передовими показниками толерантності до основних хвороб та стабільності в різних умовах вирощування.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньостиглий

РІЗНОВИД: безоста

КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ: Німеччина

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Полісся, Лісостеп

ТЕРМІНИ ПОСІВУ: середньоранні - середньопізні

ВИСОТА РОСЛИНИ: високорослий (85-90 см)

ГРУПА ЯКОСТІ: В (хлібопекарська)

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Посухостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Стійкість до вилягання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Септоріоз листя

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Борошниста роса

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Фузаріоз колоса

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Жовта іржа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Бура іржа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

0 — низький показник, 9 — високий показник

НОРМА
ВИСІВУ:
4-5 млн/га

ЛГ АНЕРІ

Середньоранній сорт з високими якісними показниками та високим рівнем урожайності.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній

РІЗНОВИД: безоста

КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ: Чехія

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Полісся, Лісостеп, Північний Степ

ТЕРМІНИ ПОСІВУ: середньоранні-середньопізні

ВИСОТА РОСЛИНИ: середньорослий (80-85 см)

ГРУПА ЯКОСТІ: А (цінна)

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Посухостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Стійкість до вилягання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Септоріоз листя

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Борошниста роса

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Фузаріоз колоса

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Жовта іржа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Бура іржа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

0 — низький показник, 9 — високий показник



НОРМА
ВИСІВУ:
4-5,5 млн/га

ЛГ АРНОВА

Ранній сорт з високими показниками урожайності та адаптації для умов України.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: ранній

РІЗНОВИД: безоста

КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ: Франція

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Полісся, Лісостеп, Північний Степ

ТЕРМІНИ ПОСІВУ: середньоранні - середньопізні

ВИСОТА РОСЛИНИ: середньорослий (80-85 см)

ГРУПА ЯКОСТІ: В (хлібопекарська)

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Посухостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Стійкість до вилягання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Септоріоз листя

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Борошниста роса

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Фузаріоз колоса

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Жовта іржа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Бура іржа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

0 — низький показник, 9 — високий показник

НОРМА
ВИСІВУ:
3,5-4,5 млн/га

ПЛЕЯДА

Середньостиглий, інтенсивний, високопродуктивний сорт з високими показниками зимостійкості та толерантністю до основних хвороб.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньостиглий

РІЗНОВИД: безоста

КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ: Польща

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Полісся, Лісостеп

ТЕРМІНИ ПОСІВУ: середньоранні-середньопізні

ВИСОТА РОСЛИНИ: високорослий (90-95 см)

ГРУПА ЯКОСТІ: В (хлібопекарська)

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Посухостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Стійкість до вилягання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Септоріоз листя

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Борошниста роса

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7,5 | 8 | 9 |

Фузаріоз колоса

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7,5 | 8 | 9 |

Жовта іржа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Бура іржа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

0 — низький показник, 9 — високий показник



НОРМА
ВИСІВУ:
4-5 млн/га

АЛТИГО

Короткостебельний, остистий, високоурожайний в ранній групі стиглості хлібопекарський сорт з високими показниками посухостійкості.

ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ДО ЛАМКОСТІ СТЕБЛА.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: ранній

РІЗНОВИД: остистий

КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ: Франція

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Полісся, Лісостеп, Північний Степ

ТЕРМІНИ ПОСІВУ: середньоранні - середньопізні

ВИСОТА РОСЛИНИ: середньорослий (80 см)

ГРУПА ЯКОСТІ: В (хлібопекарська)

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Посухостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Стійкість до вилягання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Септоріоз листа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Борошниста роса

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Фузаріоз колоса

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Жовта іржа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Бура іржа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

0 — низький показник, 9 — високий показник

НОРМА
ВИСІВУ:
3,5-5 млн/га

ФРІСКІ

Високоурожайний інтенсивний сорт хлібопекарської пшениці з високими показниками витривалості та стабільності в різних умовах вирощування та високою толерантністю до основних хвороб.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньстиглий

РІЗНОВИД: безоста

КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ: Німеччина

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Полісся, Лісостеп

ТЕРМІНИ ПОСІВУ: середньоранні - пізні

ВИСОТА РОСЛИНИ: середньорослий (80-85 см)

ГРУПА ЯКОСТІ: В (хлібопекарська)

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Посухостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Стійкість до вилягання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Септоріоз листа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Борошниста роса

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Фузаріоз колоса

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Жовта іржа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Бура іржа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

0 — низький показник, 9 — високий показник



НОРМА
ВИСІВУ:
3,5-5 млн/га

КОЛОНІА

Популярний сорт на українському ринку, який розкриває свій потенціал в інтенсивних технологіях вирощування. Формував урожайність 13 т/га у товарних посівах Житомирської обл.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній

РІЗНОВИД: безоста

КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ: Німеччина

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Полісся, Лісостеп

ТЕРМІНИ ПОСІВУ: ранні - оптимальні

ВИСОТА РОСЛИНИ: середньорослий (80-85 см)

ГРУПА ЯКОСТІ: В (хлібопекарська)

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зимостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Посухостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Стійкість до вилягання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Септоріоз листя

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Борошниста роса

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Фузаріоз колоса

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Жовта іржа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Бура іржа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

0 — низький показник, 9 — високий показник



НОРМА ВИСІВУ
в оптимальні терміни: **3,5-4 млн/га** | в пізні терміни: **4-4,5 млн/га**

НОВИНКА

ЛГ ТРІУМФ

Озимий 6-рядний ячмінь з високими показниками врожайності та здоров'я. Найпопулярніший озимий сорт на Чеському ринку.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньостиглий

ТИП КОЛОСУ: 6 рядний

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Полісся, Лісостеп, Північний степ

ВИСОТА РОСЛИНИ: середньорослий (85-90 см)

МАСА 1000 ЗЕРЕН: середня

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: кормовий

ХАРАКТЕРИСТИКИ СОРТУ

Стійкість до вилягання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |

Зимостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 |

Посухлстійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |

Гельмінтоспоріоз

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 |

Ринхоспоріоз

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |

0 — низький показник, 9 — високий показник



НОРМА ВИСІВУ
в оптимальні терміни: **3,5-4 млн/га** | в пізні терміни: **4-4,5 млн/га**

НОВИНКА

ЛГ ЗЕБРА

Ранній сорт озимого 6-рядного ячменю з найвищою толерантністю до вірусу жовтої карликовості, високою посухостійкістю та врожайністю. Маловибагливий до ґрунтів та попередників.

СТІЙКІСТЬ ДО ВЖЯ

ГРУПА СТИГЛОСТІ: ранній

ТИП КОЛОСУ: 6 рядний

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Полісся, Лісостеп, Північний степ

ВИСОТА РОСЛИНИ: середньорослий (80-85 см)

МАСА 1000 ЗЕРЕН: висока

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: кормовий

ХАРАКТЕРИСТИКИ СОРТУ

Стійкість до вилягання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |

Зимостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |

Посухлстійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8,5** | 9 |

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 |

Гельмінтоспоріоз

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 |

Жовта іржа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 |

Ринхоспоріоз

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 |

0 — низький показник, 9 — високий показник



НОРМА ВИСІВУ
в оптимальні
терміни: 3,5-4 млн/га
в пізні
терміни: 4-4,5 млн/га

НОВИНКА

ЛГ КАСТІНГ

Озимий 2-рядний ячмінь фуражного типу використання з високими показниками урожайності та здоров'я.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній

ТИП КОЛОСУ: 2 рядний

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Полісся, Лісостеп, Північний степ

ВИСОТА РОСЛИНИ: середньорослий (80 см)

МАСА 1000 ЗЕРЕН: висока

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: кормовий

ХАРАКТЕРИСТИКИ СОРТУ

Стійкість до вилягання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Зимостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Посухлстійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Гельмінтоспоріоз

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Жовта іржа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Ринхоспоріоз

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

0 — низький показник, 9 — високий показник

НОРМА ВИСІВУ
в оптимальні
терміни: 3,5-4 млн/га
в пізні
терміни: 4-4,5 млн/га

КАЛІФОРНІЯ

Озимий 2-рядний ячмінь інтенсивного типу. За роки випробувань сорт продемонстрував високі показники врожайності. Має високу стійкість до перезимівлі, хорошу посухлстійкість.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньостиглий

ТИП КОЛОСУ: 2 рядний

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Полісся, Лісостеп, Північний степ

ВИСОТА РОСЛИНИ: середньорослий (80-85 см)

МАСА 1000 ЗЕРЕН: висока

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: кормовий

ХАРАКТЕРИСТИКИ СОРТУ

Стійкість до вилягання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Зимостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Посухлстійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Гельмінтоспоріоз

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Жовта іржа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Ринхоспоріоз

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

0 — низький показник, 9 — високий показник



НОРМА ВИСІВУ
в оптимальні
терміни: 3,5-4 млн/га

в пізні
терміни: 4-4,5 млн/га

КАЗАНОВА

Озимий сорт 2-рядного типу подвійного напрямку використання, як на кормові так і на пивоварні цілі. Сорт адаптивного типу з високою витривалістю у критичних умовах вирощування.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: ранній

ТИП КОЛОСУ: 2 рядний

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Полісся, Лісостеп, Північний степ

ВИСОТА РОСЛИНИ: середньорослий (80-85 см)

МАСА 1000 ЗЕРЕН: висока

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: кормовий

ХАРАКТЕРИСТИКИ СОРТУ

Стійкість до вилягання

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Зимостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Посухлостійкість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Гельмінтоспоріоз

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Жовта іржа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Ринхоспоріоз

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

0 — низький показник, 9 — високий показник



НОРМА ВИСІВУ
в оптимальні
терміни: 3-3,5 млн/га

в пізні
терміни: 3,5-4 млн/га

ЛГ ТОССА

Дуже висока врожайність у поєднанні з відмінними якісними показниками для пивоварної галузі.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній

ТИП КОЛОСУ: 2 рядний

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Центральна-західна частина України

ВИСОТА РОСЛИНИ: середньорослий (75 см)

ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ: 2 см

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: пивоварний/фуражний

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ:

Вміст білку

Крупність

Екстрактивність

низький (10-11.5%)

дуже висока

83%

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Гельмінтоспоріоз

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Карликова іржа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Ринхоспоріоз

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Рамуляріоз

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

0 — низький показник, 9 — високий показник



НОРМА ВИСІВУ
в оптимальні терміни: 3,2-3,7 млн/га
в пізні терміни: 3,5-4,2 млн/га

ЛГ БЕЛЬКАНТО

Лідер по врожайності та стабільності в континентальних умовах. Завдяки якісним показникам відмінно підходить для пивоварної галузі.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньостиглий

ТИП КОЛОСУ: 2 рядний

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Центральньо-західна частина України

ВИСОТА РОСЛИНИ: середньорослий (75-80 см)

ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ: 2 см

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: пивоварний/фуражний

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ:

Вміст білку	низький (10-11.5%)
Крупність	дуже висока
Екстрактивність	83%

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Гельмінтоспоріоз

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Карликова іржа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Ринхоспоріоз

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Рамуляріоз

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

0 — низький показник, 9 — високий показник

НОРМА ВИСІВУ
в оптимальні терміни: 3-3,5 млн/га
в пізні терміни: 3,5-4 млн/га

ЛГ ФЛАМЕНКО

Відмінні пивоварні якості та комбінація агрономічних переваг для успішного отримання високих сталих врожаїв.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньопізній

ТИП КОЛОСУ: 2 рядний

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Центральньо-західна частина України

ВИСОТА РОСЛИНИ: середньорослий (75 см)

ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ: 2 см

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: пивоварний/фуражний

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ:

Вміст білку	низький (10-11.5%)
Крупність	дуже висока
Екстрактивність	83%

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Борошниста роса

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Гельмінтоспоріоз

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Карликова іржа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Ринхоспоріоз

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Рамуляріоз

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

0 — низький показник, 9 — високий показник



НОРМА
ВИСІВУ:
0,9-1,2 млн/га

БОКСЕР

Сорт жовтозерного гороху, який відмінно себе зарекомендував в умовах України. Характеризується невибагливістю до умов вирощування.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньопізній

КОЛІР ЗЕРНА: жовтий

ОДНОРІДНІСТЬ ЗАБАРВЛЕННЯ ЗЕРНА: 99 %

ФОРМА ЗЕРНА: кругла

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Полісся, Лісостеп, Північний степ

ВИСОТА РОСЛИНИ: 95 см

СЕРЕДНІЙ ВМІСТ БІЛКУ: 24%

ХАРАКТЕРИСТИКИ СОРТУ:

Маса 1000 зерен	висока
Стійкість до вилягання	висока
Стійкість до осипання	висока
Посухлстійкість	висока

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Кореневі гнілі

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Борошниста роса

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Вірусні хвороби

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

0 — низький показник, 9 — високий показник

НОРМА
ВИСІВУ:
1-1,2 млн/га

ЛГ КІНГФІШЕР

Зеленозерний сорт гороху, з високими показниками врожайності та якості. Висока стійкість до вилягання та легкий у збиранні.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньостиглий

КОЛІР ЗЕРНА: зелений

ОДНОРІДНІСТЬ ЗАБАРВЛЕННЯ ЗЕРНА: 99 %

ФОРМА ЗЕРНА: кругла

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Полісся, Лісостеп, Північний степ

ВИСОТА РОСЛИНИ: 90-95 см

СЕРЕДНІЙ ВМІСТ БІЛКУ: 23-24%

ХАРАКТЕРИСТИКИ СОРТУ:

Маса 1000 зерен	середня
Стійкість до вилягання	дуже висока
Стійкість до осипання	висока
Посухлстійкість	висока

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Кореневі гнілі

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Борошниста роса

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Вірусні хвороби

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

0 — низький показник, 9 — високий показник

ТОВ «Лімагрейн Україна»
Київ – Україна – 04053
вул. Тургенєвська, 55
тел. / факс: +38 044 484-67-76
тел.: +38 044 339-97-97
e-mail: Limagrain.ukraine@limagrain.com

Для нотаток:



We create chemistry



Clearfield®

Виробнича система для ріпаку

Нопасаран®

Стоп бур'ян!
Тільки ріпак!

Нопасаран® у виробничій системі Clearfield®

Виробнича система Clearfield® для ріпаку – це унікальне поєднання гербіциду Нопасаран® і високоврожайних гібридів ріпаку, стійких до цього гербіциду. Стійкість гібридів ріпаку отримано традиційним способом селекції, без використання методів генної інженерії. Однократне внесення гербіциду Нопасаран® (з ад'ювантом ПАР Метолат®) не лише знищує пророслі до моменту обробки бур'яни, але й створює ґрунтовий гербіцидний екран, який стримує подальші хвилі бур'янів.

Нопасаран® у виробничій системі Clearfield® – це унікальна можливість контролю широкого спектра бур'янів у посівах ріпаку шляхом післясходового внесення гербіциду з гнучкими термінами застосування. Рекомендується застосовувати Нопасаран®, коли більшість бур'янів активно ростуть та перебувають на початкових фазах розвитку: дводольні у фазі 2–4 справжні листки, однодольні – 1–3 листки.

Характеристика препарату

Діючі речовини	метазахлор (375 г/л) + імазамокс (25 г/л)
Препаративна форма	концентрат суспензії (КС)
Розподіл у рослині	системний; проникає як через листя, так і через кореневу систему бур'янів
Норма витрати робочої рідини	200–350 л/га
Упаковка	коробка: 1 x 10 л Нопасаран® + 1 x 10 л ПАР Метолат або окремі пластикові каністри 10 л

ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ	ЦІННІСТЬ ДЛЯ ФЕРМЕРА
Одна обробка після сходів культури	Зручність та простота застосування
Гнучкість у строках застосування	
Без заробки у ґрунт	
Розкриття повного потенціалу культури (за рахунок високого рівня ефективності проти всіх однорічних бур'янів)	Підвищення врожайності – збільшення прибутку
Контроль бур'янів, які впливають на вміст глюкозинолатів та домішок	Покращення якості насіння ріпаку – збільшення прибутку
Ефективний при різних способах обробки ґрунту, включаючи мінімальний та нульовий	Технологічна адаптованість
Підходить для складних ґрунтових умов: високий вміст органічних речовин, кам'янисті ґрунти	

Перелік чутливих до гербіциду Нопасаран® бур'янів

Амброзія полинолиста
Ambrosia artemisiifolia

Бромус (стоколос) (види)
Bromus spp.

Вероніка (види)
Veronica spp.

Вівсюг звичайний
Avena fatua

Вовчок (види)
Orobanche spp.

Галінсога дрібнокріткова
Galinsoga parviflora

Герань (види)
Geranium spp.

Гібіскус трійчастий
Hibiscus trionum

Гірчак почечуйний
Polygonum persicaria

Гірчиця польова
Sinapis arvensis

Горобейник польовий
Lithospermum arvense

Грицики звичайні
Capsella bursa-pastoris

Гусимець Тяля
Arabidopsis thaliana

Дурман звичайний
Datura stramonium

Жабрій звичайний
Galeopsis tetrahit

Жовтозілля звичайне
Senecio vulgaris

Зірочник середній
Stellaria media

Канатник Теофраста
Abutilon theophrasti

Кропива глуха пурпурова
Lamium purpureum

Кропива жалка
Urtica urens

Курачі очка польові
Anagallis arvensis

Кучерявець Софії
Descurainia sophia

Латук дикий
Lactuca serriola

Лобода (види)
Chenopodium spp.

Лутига розлога
Atriplex patula

Метлюг звичайний
Apera spica-venti

Мишій (види)
Setaria spp.

Незабудка польова
Myosotis arvensis

Нетреба звичайна
Xanthium strumarium

Осот городній
Sonchus oleraceus

Осот жовтий
Sonchus arvensis

Пальчатка кровоспиняюча
Digitaria ischaemum

Паслін чорний
Solanum nigrum

Петрушка собача звичайна
Aethusa cynapium

Підмаренник чіпкий
Galium aparine

Портулак городній
Portulaca oleracea

Празелень звичайна
Lapsana communis

Приворотень польовий
Aphanes arvensis

Просо куряче (плоскуха)
Echinochloa crus-galli

Редька дика
Raphanus raphanistrum

Роман польовий
Anthemis arvensis

Ромашка (види)
Matricaria spp.

Рутка лікарська
Fumaria officinalis

Свербіга східна
Bunias orientalis

Спориш звичайний
Polygonum aviculare

Суріпиця звичайна
Barbarea vulgaris

Сухоребрик льозеліїв
Sisymbrium loeselii

Талабан польовий
Thlaspi arvense

Тонконіг (види)
Poa spp.


Ториця польова
Spergula arvensis

Череда трироздільна
Bidens tripartita

Чистець польовий
Stachys arvensis

Щириця (види)
Amaranthus spp.

Clearfield®-система захисту озимого ріпаку





Контакти

Менеджер з розвитку проекту силосної кукурудзи LGNA

Євгеній Кришталь
+380 99 740-03-74, levgenii.kryshstal@limagrain.com

Керівник відділу по роботі з ключовими партнерами

Сергій Басанець
+380 50 442-79-89, sergii.basanets@limagrain.com

Менеджер по роботі з ключовими партнерами Центрально-східного регіону

Роман Нарожний
+380 50 472-34-72, roman.narozhnyi@limagrain.com

Менеджер по роботі з ключовими партнерами центрально-західного регіону

Ігор Стояновський
+380 50 339-20-05, igor.stoyanovskiy@limagrain.com

Менеджер по роботі з ключовими партнерами центрального регіону

Андрій Дашевський
+380 50 449-72-43, andriy.dashevskiy@limagrain.com

Директор сектору центрально – західного регіону

Волинська, Рівненська обл.,
Олександр Балагура
+380 50 339-20-01
oleksandr.balahura@limagrain.com

Регіональний продукт менеджер

Вінницька, Тернопільська, Львівська,
Хмельницька, Рівненська, Волинська,
Івано-Франківська, Чернівецька обл.,
Микола Романенко
+380 50 442-76-18
mykola.romanenko@limagrain.com

Менеджер з регіонального розвитку

Тернопільська, Львівська,
Івано-Франківська обл.,
Микола Солян
+380 50 359-63-98
solian.mykola@limagrain.com

Регіональний продукт-менеджер

Ярослав Скаковський
+380 95 262-50-18
iaroslav.skakovskiy@limagrain.com

Менеджер з регіонального розвитку

Вінницька обл.,
Марія Редька
+380 50 325-96-23
mariia.redka@limagrain.com

Менеджер з регіонального розвитку

Хмельницька обл.,
Василь Малюк
+380 50 463-39-82
vasyl.maluk@limagrain.com

Менеджер з регіонального розвитку

Хмельницька, Чернівецька обл.,
Галачинська Мирослава
+380 50 383-09-94
Myroslava.halachynska@limagrain.com

Менеджер з регіонального розвитку

Житомирська обл.,
Артем Томчук
+380 50 233-32-64
artem.tomchuk@limagrain.com

Менеджер з регіонального розвитку

Вінницька обл.,
Євген Косенко
+380 50 389-89-03
Evgen.kosenko@limagrain.com

Менеджер з регіонального розвитку

Вінницька обл.,
Андрій Здовбіцький
+380 95 271-33-30
Andrii.ZDOVBITSKYI@limagrain.com

Менеджер з регіонального розвитку

Львівська обл.,
Сергій Степаненко
+380 99640-92-01
Sergii.Stepanenko@limagrain.com

Старший менеджер з регіонального розвитку

Вінницька обл.,
Артем Беспавлов
+380 50 364-76-81
Artem.BESPAVLOV@limagrain.com

Директор сектору центрального регіону Черкаська, Кіровоградська, Чернігівська, Київська обл., Андрій Андрієнко +380 50 755-36-61 andrii.andriienko@limagrain.com	Старший менеджер з регіонального розвитку Чернігівська, Київська обл., Юрій Нестеренко +380 50 486-55-56 yurii.nesterenko@limagrain.com	Менеджер з регіонального розвитку Київська обл., Вадим Смілянець +380 50 339-20-31 vadim.smilyanets@limagrain.com
Менеджер з регіонального розвитку Кіровоградська обл., Анатолій Швець +380 50 339-20-16 anatolii.shvets@limagrain.com	Менеджер з регіонального розвитку Черкаська обл., Костянтин Попов +380 50 410-74-36 kostiantyn.popov@limagrain.com	Менеджер з регіонального розвитку Черкаська обл., Володимир Гвоздь +380 50 410-74-29 volodymyr.gvozd@limagrain.com
Менеджер з регіонального розвитку Київська, Чернігівська обл., Сергій Сенченко +380 95 928-82-45 sergiy.senchenko@limagrain.com	Менеджер з регіонального розвитку Віталій Ільницький Кіровоградська обл., +380 50 389-89-05 vitaliy.ilnitskiy@limagrain.com	
Директор сектору південно-східного регіону Херсонська, Миколаївська, Одеська, Запорізька, Дніпропетровська обл., Олексій Жужа +380 50 380-92-55 oleksiy.zhuzha@limagrain.com	Старший менеджер з регіонального розвитку Запорізька, Дніпропетровська обл., Віталій Шишка +380 50 448-53-89 vitalii.shyshka@limagrain.com	Менеджер з регіонального розвитку Дніпропетровська обл., В'ячеслав Суров +380 50 416-57-93 vyacheslav.surov@limagrain.com
Менеджер з регіонального розвитку Дніпропетровська обл., Максим Оруджов +380 95 272-00-89 maksym.orudzhov@limagrain.com	Менеджер з регіонального розвитку Одеська обл., Олексій Пашали +380 66 600-23-31 oleksiy.pashaly@limagrain.com	Менеджер з регіонального розвитку Дніпропетровська обл., Олександр Леухін +380 68 944-44-29 oleksandr.leukhin@limagrain.com
Регіональний продукт-менеджер Віталій Богун +380 50 448-41-06 vitaliy.bogun@limagrain.com	Менеджер з регіонального розвитку Миколаївська обл., Микола Раковський +380 50 324 43 86 Mykola.RAKOVSKYI@limagrain.com	
Директор сектору центрально – східного регіону Донецька, Луганська, Харківська, Полтавська, Сумська обл., Олександр Шевченко +380 50 449-71-87 oleksandr.shevchenko@limagrain.com	Старший менеджер з регіонального розвитку Харківська обл., Юлія Ісечко +380 95 270-08-45 iuliia.isechko@limagrain.com	Менеджер з регіонального розвитку Сумська обл., Віталій Авраменко +380 95 275-25-70 vitaliy.avramenko@limagrain.com
Менеджер з регіонального розвитку Харківська обл., Петро Прозапас +380 95 231-16-52 petro.prozapas@limagrain.com	Менеджер з регіонального розвитку Харківська обл., Максим Гуржій +380 50 424-81-00 maksym.gurzhi@limagrain.com	Менеджер з регіонального розвитку Полтавська обл., Юрій Лук'янчик +380 50 806-69-28 yurii.lukianchik@limagrain.com
Регіональний продукт-менеджер Геннадій Тарасенко +380 50 386-87-67 hennadii.tarasenko@limagrain.com	Менеджер з регіонального розвитку Полтавська обл., Валерій Фурсо +38 050 389-89-07 Valerii.furso@Limagrain.com	



Офіційні дистриб'ютори

ТОВ «ФІРМА ЕРІДОН»

Києво-Святошинський р-н, Київська обл., Україна, 08131, с. Софіївська Борщагівка (промвузол Жуляни), вул. Чорновола, 30

+380 (44) 536-92-02

office@eridon.ua

www.eridon.ua

ПП «ІН ФОРС КЕМІКАЛ»

Україна, 08140, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Білогородка, вул. Богатирська, будинок 2Б

080 033-96-23

office@ifchemical.com

ТОВ «Агроресурс-А»

Кропивницький, вул. Мурманська, 29-М

052 235-90-35

office@agro.kr.ua

www.agro.kr.ua

ТОВ «АгроРось»

19400, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка, 39

047 352-58-55

office@agroros.com.ua

www.agroros.com.ua

ТОВ «Полетехніка»

69002 м. Запоріжжя, вул. Космічна, 121в

061 222-32-11

office@poletehnika.in.ua

www.poletehnika.com.ua

ТОВ «Спектр-Агро»

Київська обл., м. Обухів, вул. Промислова, 20

056 969-62-82

agro@spectr-agro.com

www.spectr-agro.com

ТОВ «Укragроресурс»

61035, м. Харків, просп. Гагаріна, 127а, оф. 305, 307

057 737-23-44

ukragroresurs@ukr.net

ГРУПА КОМПАНІЙ «АГРО ЕКСПЕРТ»

09200, вул. Каштанова, 54, м. Кагарлик, Київська обл.

044 536-39-00

067 234-40-80

agro-e@ukr.net

КОМПАНІЯ «РОСТОК-АГРО»

Україна, Кіровоградська обл.

м. Кропивницький

вул. Аджамська, 274

050 457-16-15

ТОВ «Захід Агробізнес»

33016, вул. Будівельників, 1, м. Рівне

+38 067 354-03-02

info@zahidagro.biz

www.zahidagro.biz

ТОВ «НОР-ЕСТ АГРО»

09800, вул. Соборна, 3, м. Тетіїв, Київська обл.

+38 044 334-36-24

info@nor-estagro.com

nor-estagro.com

LNZ Group

20635 Черкаська обл. Звенигородський р-н, с. Лебедин вул. Заводська 17

+38 097 000-77-72

office@lnz.com.ua

www.lnz.com.ua/

ТОВ «АГРО СОЛЮШЕН»

51486, Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н, село Богуслав вул. Тернівська, 2/2,

+38 (066) 050-47-69,

+38 (067) 657-55-20

tovagrosolution@gmail.com

ПУМБ



**Raiffeisen
Bank**

Разом з Україною



**CRÉDIT
AGRICOLE**

ОЩАДБАНК

МІЙ БАНК. МОЯ КРАЇНА



60
років

СКОРИСТАЙСЯ ПРИВАБЛИВИМИ УМОВАМИ
**ФІНАНСУВАННЯ ВІД
БАНКІВ-ПАРТНЕРІВ**

**СЕЛЕКЦІЯ
ВАШОГО
ПРИБУТКУ
З ЛІМАГРЕЙН**

КУКУРУДЗА | СОНЯШНИК | РІПАК | ЗЕРНОВІ





ТОВ «Лімагрейн Україна»
вул. Олександра Кониського, 55, 04050,
тел./факс: +38 044 484-67-76
тел.: +38 044 339-97-97
e-mail: Limagrain.ukraine@limagrain.com

www.lgseeds.com.ua